



Die Bienen.

Landwirtschaftliche Beilage zum „Soester Kreisblatt“

Mr. 21

Soest, den 24. Mai 1928

27. Jahrgang

Bodenschutz und Staudenbeete.

Von E. Schüller.

Ganz gleich, welchen Boden ein Garten aufweist, immer werden Luft und Wasser entscheidende Rollen für das gesunde Pflanzenwachstum spielen. Es ist aber oft nicht ganz einfach, gerade in diesen Punkten die besten Bedingungen herzustellen und zu erhalten. Der leichte, lockere Sandboden hält das Wasser nicht fest und bedroht die Pflanzen dauernd mit Dürst, außerdem erhöht er sich an heißen Sommertagen so stark, daß die Pflanzen fast verdorren. Bei Lehm- und Tonböden gibt es wieder andere, nicht weniger ernste Gefahren. Raum ist das Beet bepflanzt, und man gießt an oder spritzt, so fängt auch schon die Oberfläche an zu verschleimen, und bei trockenem Wetter bildet sie dann eine harte Kruste, die allen ferneren Luft- und Wasseraustausch im Boden verhindert. Die Wurzeln sind in die harte Masse eingeklemmt und vermögen ihre Pflanzen nur kümmerlich zu versorgen. Nach jedem Regen mühte hier, wenn der Boden abgetrocknet ist, gehakt werden, um ihn für weiteres Gießen, Spritzen und Regnen aufnahmefähig zu machen. Dazu fehlt nun leider meist die Zeit.

Es gibt aber einen Ausweg, der in gleicher Weise dem Sandboden wie dem Lehm- und Tonboden bessere Anbaubedingungen schafft: das Belegen der Beete mit kurzem Pferdehaare. Am besten geschieht es im Frühjahr gleich nach der Pflanzung oder bei unverändert bleibenden Anlagen auch schon im Herbst. Wenn der Dung den Winter über liegt, verliert er seine Schärfe, bis die Pflanzen wieder treiben. Im Frühjahr verwendet man nur älteren Dung, der schon etwas verrottet ist, oder man arbeitet in der Karre Torfmüll dazu und streut ihn darüber. Von allen strohigen Teilen geläubert fällt dieses Bodenbedeckungsmittel gar nicht unangenehm auf, es bietet aber einen großen Vorteil, indem es den Boden gleichmäßig feucht und locker hält. Es beugt dem Verkrusten und Verschleimen der Oberfläche ebenso wie dem schnellen Austrocknen und übermäßigen Erhitzen vor. Auch Mangel an Luft werden die Wurzeln dann nicht leiden. Daß ihnen bei jedem Gießen und Regen etwas Dungkraft zugeführt wird, ist auch noch als Gewinn zu buchen.

Vorteile und Bedingungen des Luzernebaues.

Von H. D. Wallr.

Was der Koffler für kühler, feuchere Gegenden bedeutet, das ist in warmen, trockenen Lagen die Luzerne. Sie stammt aus südlichen Gegenden und gedeiht am besten in den warmen Landstrichen von Ungarn, Italien, Spanien und Frankreich. Schon von den Römern wurde sie geschätzt. Vor etwa 250 Jahren gelangte sie von Frankreich aus nach Deutschland, und heute kommt sie vielfach, besonders auf den Eisenbahndämmen, verwildert vor. Sie hat sich also bei uns eingebürgert, aber beweist doch noch ihre Herkunft aus wärmeren Ländern. Wo ihr der Boden und das Klima zulagt, da bleibt sie lange auf derselben Stelle; im Weizenfeld hält sie 12 bis 15 Jahre aus, in kühleren und feuchteren Gegenden muß man sie dagegen schon nach 4 bis 5 Jahren umbrechen. Ihre Wurzeln dringen sehr tief in den Boden ein und daher widersteht sie der Hitze besser als andere Kleanteln, leidet aber nicht dem rauhen Winterwetter.

Die Luzerne gibt schon vor dem ersten Kofflerchnitt ein schmackhaftes Grünfutter, so daß die Grünfütterung schon zwei bis drei Wochen früher beginnen kann. Ist der erste Kofflerchnitt aufgeführt, dann kommt der zweite Luzernechnitt an die Reihe. Sie wächst dann noch einmal, unter Umständen sogar zweimal wieder nach. Deshalb baut man auch dort Luzerne, wo man wenig Vieh hat und dieses Futter ist fast ebenso bequemlich wie gutes Viehfutter und kann selbst von jungen Tieren gefressen werden. Im Gehalt steht die Luzerne nicht oder nur wenig hinter dem Koffler zurück, nur verholzt sie schneller. Sie bildet eine sehr gute Vorfrucht für Getreide und Hackfrüchte, nur selbst darf sie nicht lobad wiederkehren, es soll die doppelte Zeit dazwischen liegen, wie sie selbst den Bestand bildet.

Für 100 Quadratmeter braucht man 300 Gramm Luzerne samen. Das Hauptgewicht ist beim Anbau auf den Untergrund zu legen. Wo er feucht oder gar nah oder steil und steinig ist, wächst die Luzerne nicht. Sonst stellt sie keine hohen Ansprüche an den Boden. Außer auf magerem Sand und ähmem Tonboden gedeiht sie auf allen Bodenarten, am besten auf mildem, kalkhaltigem, langem Lehm und lehmigem Sand. Als Weiderfrucht wählt man gewöhnlich Gerste, ist diese jedoch nur dünn. Nach besser ist man sie unter Hafer und mäht diesen grün, bevor er den Boden bedeckt. Vielfach baut man die Luzerne auch ohne Weiderfrucht, damit sie sich im ersten Jahre recht gut befestigt.

Man sät die Luzerne nicht vor Anfang Mai und dann bis in den Juni hinein. Man kann sie auch in schon stehendes Getreide streuen. Den besten Erfolg hat man, besonders auf schwerem und unfruchtlichem Boden, wenn man die Luzerne recht weitläufig, auf 20 bis 25 Zentimeter, drückt und dann hackt. Wie alle kleinen Samenarten muß auch die Luzerne flach untergebracht werden, dazu wälzt man vor der Saat den Boden fest, damit die Drillschare nicht zu tief einsinkt. Um die Luzerne rein zu halten, muß sie nach jedem Schnitt gründlich abgeegert werden; bei Drillsaat ist es das beste, im ersten Jahre quer zu den Reihen zu eggen und den Reihen entlang zu hacken.

In den ersten Jahren verträgt die Luzerne das Beweiden nicht, besonders empfindlich ist sie gegen Schafst. Am meisten Mähe wird man, wie beim Koffler, stets durch Mähen ernten. Da die Luzerne leichter als Koffler verholzt, wird sie vor der Blüte gemäht. Der letzte Schnitt muß so rechtzeitig genommen werden, daß die Pflanzen nicht allzu hoch in den Winter gehen. Grüne und getrocknete Luzerne eignen sich vorzüglich zur Fütterung für Ziegen. Auch Schafe fressen Luzerne gern, dagegen ist sie für Schweine nicht so gut. Das Heu muß vorsichtig gedroschen werden, weil sonst alle feinen Blätter und Wurzeln abfallen und das sonst wertvolle Futter ähnlich wie Stroh wirkt.

Auf leichtem Boden, wo die gute Luzerne nicht mehr recht fortkommt, gedeiht die blaue französische Luzerne sehr ähnlich Sandluzerne. Sie hält aber nicht so lange wie jene aus und gibt auch weniger Futter von geringerem Nährwert.

Kuckspflanzen im Schatten und Halbschatten.

Kast jeder Garten hat Stellen, die dem Sonnenschein gar nicht oder nur ganz kurze Zeit am Tage zugänglich sind, sei es durch beschattende Krone von Obst- und Laubbäumen oder durch Gebäude, Mauerwerk, dicke Zäune, Geden usw. Daß die an solchen Orten stehenden Pflanzen nicht den vollen Ertrag liefern können, ist selbstverständlich; trotzdem soll man derartige

Der Imker im Frühsommer.

Die Obstblüte geht zu Ende, in manchen Gegenden blühen bald die Weizen. Die Bienen haben sich im allgemeinen gut entwickelt. Das in den letzten Wochen herrschende kalte Wetter hat allerdings auch manchen Schaden verursacht. Die Völker hatten schon viel Brut und viele Flugbienen, als es einsetzte, und so gingen viele Bienen auf den Trachtausflügen zugrunde. Wir müssen deshalb mit dem Ausdehnen des Brutnestes vorsichtig sein und dürfen den Bienen keine leeren Waben oder Mittelwände ins Brutnest hängen und dieses hierdurch zerreißen. Es genügt, wenn man die leeren Waben oder die Mittelwände außen ans Brutnest heranschiebt, zwischen die Deckwabe und die letzte Wabe des Brutnestes. Bei starken Völkern und günstigem Wetter braucht man natürlich nicht so ängstlich zu sein, besonders bei warmem Wetter können sie die Brut gut bedecken.

Auf der anderen Seite heißt es jetzt auch geben, und je wärmer das Wetter, desto mehr, daß die Völker nicht gar zu sehr eingeschränkt sind, da sie sonst gleich auf Schwarmgedanken kommen. Das beste Schwarmverhütungsmittel ist und bleibt natürlich eine gute Tracht. Danach ist immer noch das Beste, daß man keine Bienen recht bauen läßt, so viel sie wollen. Die besten Waben erhält man mit ganzen Mittelwänden. Anhangstreifen und dergleichen sind immer nur ein Notbehelf.

Sobald ein Volk stark genug ist, so daß es den Brutraum fast ganz füllt, schneidet man an die Deckung des Honigraumes. Am besten hängt man in den Honigraum zwei, vielleicht auch drei Waben mit gedeckelter Brut. Hierdurch werden die Bienen zum früheren Verlassen des Honigraumes veranlaßt. Offene Brut in den Honigraum zu hängen, ist ein Fehler. Es dauert immer erst einige Zeit, bis sie schlüpfen und die Zellen für Honig freimachen, und außerdem sehen die Bienen im Honigraum sehr gern Wieselzellen an, was zu einem gänzlich unermuteten und daher doppelt unwillkommenen Schwarm führen kann.

Treffen die Bienen Vorbereitungen zum Schwärmen, so ist es immer noch das Beste, ihnen ihren Willen zu lassen. Ist es schon einmal so weit gekommen, daß sie Wieselzellen ansetzen, so lassen sie sich selten vom Schwärmen abhalten, wenn nicht eine Zeit schlechten Wetters oder eine Trachtpause dazwischen kommt. Man läßt sie also dann ruhig dazwischen und bricht nur nach dem Abzug des Schwarmes die Wieselzellen aus, um den Nachschwarm zu verhindern, wenn man nicht gerade Wert auf ihn legt. In Frühjahrsgegenden ist ein Schwarm vor der Tracht nicht erwünscht, da er unbedingt den Ertrag vermindert, ja bisweilen jeden Ertrag unmöglich macht, und oft genug vermögen sie in ausgeprochenen Frühjahrsgegenden weder Mutterstock noch Schwarm ausreichend für den Winter zu verpropagieren. Nach Schluß der Tracht, also etwa Ende Juni, schadet ein

Schwarm dem Ertrag in einer Frühjahrsgegend natürlich nicht, obgleich er gänzlich für den Winter aufgefüttert werden muß. Das ist aber nicht so schlimm. Wer nicht mehr vermehren will, kann solche Schwärme immer noch gut verkaufen. Maisschwärme werden zwar besser bezahlt, aber der Ertrag dafür wiegt den entgangenen Ertrag nicht auf. In Spätrjahrsgegenden ist dies natürlich anders; Mutterstock und Schwarm können bis zur Tracht noch gut erstarben. Beide können noch gut winterfähig werden und Nutzen bringen.

Was haben wir nun beim Auszug eines Schwarmes zu tun? Zunächst einmal gar nichts als zusehen, sofern wir Zeit dazu haben. Wer geschickt ist, kann die Königin abfangen, wenn sie zum Flugloch herausfliegt. Gelingt dies, so ist natürlich alles am leichtesten zu ordnen. Man braucht sie nur in einen Weiselkäfig zu sperren und diesen in der nächsten Nähe des Bienenstandes aufzuhängen. Die Bienen finden die Königin schon, und der ganze Schwarm setzt sich an den Käfig. Sonst wird man warten müssen, bis sich der Schwarm an einem Baum oder Strauch in der Nähe gesammelt hat. Sobald er ruhig steht, kann man ihn mit einer offenen Kiste oder einem leeren Bienenkorb fassen. Man hält die Kiste mit der Deckung nach oben unter den Schwarm und gibt dem Zweig, woran er hängt einen kurzen kräftigen Ruck, der den Schwarm sofort in die Kiste wirft. Diese stellt man dann, diesmal mit der Deckung nach unten, auf den Boden. Ein unter den Rand gelegtes Holz gestattet den noch umherfliegenden Bienen den Zutritt, und nach einer Viertelstunde kann man den Schwarm schon abholen. Man muß freilich darauf achten, daß die Königin nicht an der Anschlagstelle des Schwarmes zurückgeblieben ist. Denn sonst ziehen die Bienen aus der Kiste alle wieder aus und kehren an die alte Stelle zurück. Die Kiste muß auch in den Schatten gestellt werden. Scheint die Sonne darauf, dann geht der Schwarm in kurzer Zeit davon auf Nimmerwiedersehen.

Hat man den Schwarm von der Fangstelle entfernt, so stellt man ihn am besten bis zum Abend in einen kühlen Keller. Am Abend kurz vor Dunkelwerden bringt man ihn auf den Bienenstand und schlägt ihn in die mit Mittelwänden ausgestattete Beute ein. Da die Bienen eines Schwarmes in ihren Honigblasen sich Futter für 48 Stunden mitnehmen, hat es keinen Zweck, einen Schwarm vor dieser Zeit zu füttern, ja man würde ihn hierdurch nur zum Auszug veranlassen. Nach Ablauf dieser Zeit ist es allerdings das Beste, selbst bei guter Tracht alle Abende etwa einen halben bis ganzen Liter Zuckerwasser vom Fütterungsverhältnis 1:1 zu füttern, bis der Bau bis unten hin fertig ist.

Wäre nicht ganz ungenutzt liegen lassen. Gibt es doch eine ganze Anzahl Pflanzen, die sich auch noch im Schatten mit Erfolg anbauen lassen.

Gut gedeihen an solchen Stellen z. B. Schnittlauch und Pfefferminze. An Mauern ist die Anpflanzung von Brombeeren empfehlenswert. Auch mit schwarzen Johannisbeeren kann man es versuchen. Wenn sie auch nicht viel Ertrag geben, so deckt das grüne Laubwerk doch wenigstens manche der Plätze.

Eine sehr dankbare Pflanze auf Schattensstellen ist der Kumpel. Man sät ihn im Mai auf ein gut gedüngtes Beet und legt im August die Pflanzen an die beschatteten Stellen. Im nächsten Jahre erntet man Samen. Auch Meerrettich wächst noch im Schatten, doch muß der Boden gut gedüngt und locker sein. Ebenso läßt sich Petersilie auf diese Weise ziehen, vor allem die transalpinische Blattpetersilie. Einen einigermassen annehmbaren Ertrag liefern hier schließlich frühe Buchholzwurzeln.

Für halbschattige Stellen kommen weiter in Betracht die Kohlraben; am besten paßt sich unter ihnen der Winter- oder Grünkohl den Verhältnissen an. Aber auch Weiß- und Rotkohl und Wirsing bewähren sich noch. Ferner gedeihen Rautengold, Spinnat und Rauhreif gut in etwas beschatteter Lage. Kohlrüben bleiben zwar kleiner als in sonnigen Stellen, doch bietet der Anbau immerhin Vorteile. Auch für diese Kulturen ist die Voraussetzung gute Drainage des Bodens. Zwischen den Pflanzen lasse man genügend Platz zum Hacken und Jäten.

Vogelschutz beim Hausbau.

Die Fortschritte im Bauwesen der letzten Jahrzehnte haben leider viele Möglichkeiten für Vögel an Gebäuden zerstört oder vermindert. Statt verputzte Wände, lamelle Dachvorsprünge und Holzverkleidungen wehren den Vögeln, die als freilebende Wesen an den natürlichen Stellen unserer Häuser zu finden gewohnt sind, das Bauen. Deutlich kann man die Wirkung davon schon an dem Rückgang der Haus- oder Weisfalken erkennen. Daß wir mit der Abnahme der Vögelwelt zugleich wirtschaftliche Werte einbüßen, ist zu betonen, um es besonders darlegen zu müssen.

Deshalb darf man wohl annehmen, daß mancher Bauherr gern bereit ist, gleich beim Bau seines Hauses für geeignete Vögelmöglichkeiten sorgen zu lassen. Aber auch am fertigen Hause lassen sich ohne allzu große Umstände nachträglich solche Höhlen anbringen. In Mauerhöhlen nisten mit Vorliebe die Rot- und Amseln, ferner die Meisen und ihre Verwandten. Am bequemsten bieten sich für die Anlage von Nisthöhlen die Kalklöcher dar. Man braucht sie nur innen zu vermauern oder durch ein Brett zu schließen. Hierfür formt man das höhlenartige aus Zement in der Weise, daß der Boden von einer spindelförmigen Mitte aus gebildet wird und in der Höhlenwand sich einige Erhöhungen vorfinden, die den Vögeln das Ein- und Ausklettern erleichtern. Zuletzt wird die Höhle von außen durch ein mit dem Flugloch versehenes Brett geschlossen. Ein über dem Flugloch angebrachtes Brettchen verhindert das Eindringen von Regen. Es empfiehlt sich, das Fluglochbrett mit Schrauben zu befestigen, damit man es nach Bedarf abnehmen kann, um die Höhlen zu reinigen und unerwünschte Sperlingsbruten zu beseitigen. Nur an den Ost- und Südseiten der Häuser angebrachte Höhlen haben Aussicht, bezogen zu werden. Eine sorgfältig ausgeführte Nisthöhle dieser Art wird ein Haus nie verunzieren.

Der Hausfalkenlaube kann man beim Neubau dadurch beihilflich sein, daß man kleine Schuttbretter unter dem Dachvorsprung anbringt, wenn dieser zu schmal ist. Zu beachten ist dabei, daß die Raubfalkenlaube die von unangenehmem Nutzen bei der Fliegenbelästigung in Ställen ist, auf das Schuttbrett baut, die Hausfalkenlaube darunter. Reicht während der Brutzeit feuchte Erde in der Nähe der Baustelle, denn lege man einen Tümpel an. Auch der Mauersegler, der von der Laubbeobachtung viel-

fach als schädlich angesehen wird, verdient in seinem Bauriede unterstützt zu werden. Er bevorzugt die höchsten Gebäude und nistet fertige, mit Miststoffen gefüllte Höhlen an, da er seiner langen Schwingen wegen nicht imstande ist, sich Federn und Palme vom Erdboden aufzulesen.

Rein Tier leistet im Vertilgen von Mäusen sowie wie die Katzen und Füchse. Sie nisten in hohen Bäumen, in Felsen und auch gern in Gebäuden. In Felsen jagen sie für sie, indem man in der obersten Ecke des Hauses und Scheunengiebeln ein Mauerloch offen läßt und mit einem taubenschlagartigen Brutkasten ausstattet. Ein Loch in dessen Rückwand erlaubt den Nachtvögeln, auf den Dachböden ihrer Mäusejagd obzuliegen.

Nützliche Mitteilungen.

Auffklärung über Stangenbohnen. Man soll die Hülsenfrüchte nicht alle in einen Topf werfen. Wörtlich genommen tut das natürlich keine Hausfrau, aber wenn es sich um den Anbau handelt, da verfallen noch viele Laiengärtner der Sammelvorstellung: Hülsenfrüchte, d. h. Anprungslose, die den Fruchtwechselreihen beizugehen. So verhält es sich aber gar nicht. Wenn es für Erbsen und Buschbohnen zutrifft, für Stangenbohnen schon nicht, ganz und gar nicht für Stangenbohnen, für die hochgezüchteten Sorten dieser Gruppe. Sie wollen nicht nur einen guten, abgedüngten, nährstoffreichen Boden, wenn sie hohen Ertrag bringen sollen, auch die mit ihrem Anbau verbundene Mühe, wie das Steden der Stangen, das Anbinden der Ranken, ist nicht zu unterschätzen. Deshalb sollte, wer schlechten Boden bearbeitet, auf Stangenbohnen lieber verzichten und sich mit den viel beschiedeneren und zuverlässigeren Buschbohnen begnügen. Sorten wie Heinrichs Riesen ohne Fäden, können Stangenbohnen sehr gut ersetzen. Wer aber besseren, schweren Boden besitzt und Stangenbohnen sät, der sei auf eins aufmerksam gemacht: in leicht verkrustendem Boden hüte man sich, die Bohnen zu stark zu bedecken. Es kommt sonst leicht vor, daß die Samenlappen in der Erde stecken bleiben, während die Keimlinge bogenförmig herausheben. Hilft man da nicht rechtzeitig durch Befreiung der Samenlappen nach, dann sind die Pflanzen verloren. Am besten bedeckt man die Bohnensaat mit Laub- oder Komposterde oder feuchten Torfmüll, wenn der Boden des Beetes sehr schwer ist.

Ein gefährlicher Fehler beim Spargelstecken ist das Stechenlassen mangelhafter und zu dünner Stangen. Manche tun es aus Bequemlichkeit, weil solche Stangen sich nicht verwerten lassen, manche glauben sogar, es sei vorteilhaft, wenn die Spargelpflanzen durch diese Stangen zeitig zur Laubbildung gelangen, das ja die von den Wurzeln aufgenommenen Nährstoffe verarbeiten muß, damit sich Vorräte für die nächste Ernte ansammeln. Das könnte man gelten lassen, wenn die verfaulen und verkrüppelten Sprossen nicht meist von Mäden befallen wären. Dies sind die Mäden der Spargelfliegen, die in der Zeit bis etwa zum 10. Juni ihre Eier in die Köpfe der an der Beeloberfläche erscheinenden Stangen legt. Aus solchen Stangen wird selten ein brauchbarer Laubtrieb, sie geben den Mäden nur die Möglichkeit, sich im März hinab bis an den Wurzelstock zu treiben und dort zu verpuppen und zu überwintern. Durch die Ausbreitung der Spargelfliegen können die Anlagen schweren Schaden nehmen, und vorzügliche Spargelzüchter stehen deshalb sogar ganz junge Anlagen bis zum 10. Juni, obwohl die dabei gewonnenen Sprossen kaum verwertbar sind. Aus demselben Grunde ist es bedenklich, die Spargelfelder, wie manchmal empfohlen wird, abwechselnd Stück um Stück nur bis zum 1. Juni abzuräumen, um den Pflanzen Gelegenheit zu geben, sich durch frühe Laubentwicklung zu stärken. Diesen Zweck erreicht man ebenso gut, wenn man zwischen dem 10. und 12. Juni teilweise mit dem Stechen aufhört.