



ie Börde.

Landwirtschaftliche Beilage zum „Soester Kreisblatt“

nr. 46

Donnerstag, den 24. November

27. Jahrgang

Der Stallmist auf dem Acker.

Von B. D. Walter.

Die rechte Zeit zum Düngen mit Stallmist ist im Allgemeinen der Herbst, streng genommen kann man jedoch die Frage, ob man den Dünger sofort unterbringen oder den Winter über auf dem Acker liegen lassen soll, nur von Fall zu Fall beantworten. Denn alle Arbeiten bei der Vorbereitung und Bestellung des Landes richten sich nach dem Boden. Danach ergeben sich folgende Regeln.

Bei schwerem, kaltem, bindigem Boden kommt es in erster Linie auf die natürliche Wirkung des Düngers an. Er soll den Boden lockern und wärmen, und deshalb ist es notwendig, daß die Verwertung des Düngers in der Erde vor sich geht. Durch die Verwertung des Düngers fördert man die sogenannte Bodengare, und das ist unendlich wichtig. Sie entsteht durch das Bakterienleben in dem Boden. Wo Fäulnis und Verwesung eintritt, sammeln sich die Bodenbakterien zu ihrer sehr wichtigen Aufgabe, die Bodenbestandteile aufzulockern und sie für die Aufnahme durch die Pflanzen vorzubereiten. Ein schwerer, bindiger Boden wird durch den Stallmist locker und gar. Deshalb bringen wir hier den Dünger so schnell wie möglich unter.

Anders bei leichtem Bodenarten. Bei ihnen ist es angebracht, den Stallmist im Spätherbst einige Zeit auf dem Acker ausgetrocknet liegen zu lassen. Es geht dabei wenig verloren vom Gehalt des Düngers. Die Pflanzennährstoffe werden zum Teil vom Regen gelöst und sinken mit ihm in den Boden ein. Je gleichmäßiger der Mist gestreut wurde, desto gleichmäßiger verteilen sich die löslichen Bestandteile des Düngers. Praktische Landwirte haben die Erfahrung gemacht, daß auf leichtem Boden die Ernterträge höher waren, wenn der Dünger längere Zeit auf dem Felde liegen geblieben war und erst im Winter untergepflügt wurde. Die Bodengare wird im leichteren Boden nämlich durch Bedecken des Bodens besonders gefördert. Er kann dann nicht austrocknen und das Bakterienleben ist vor schädlicher Einwirkung des Sonnenlichts geschützt. Selbst wenn der Dünger scheinbar ganz trocken geworden ist, hält er sich doch dort, wo er dem Boden aufliegt, noch feucht, und gerade hier unter dem Einfluss von Feuchtigkeit und Wärme, ohne daß die direkten Sonnenstrahlen einwirken können, entfaltet sich ein reges Bakterienleben. Natürlich ist es notwendig, zur Erreichung dieses Zweckes den Boden möglichst gleichmäßig mit Dünger — und zwar mit gutem Dünger — zu belegen. Schon bei der Anfuhr des Düngers auf das Feld sollte man hierauf Rücksicht nehmen und den Mist nicht so ausstreuen, wie er gerade kommt, sondern möglichst alten Mist und frischen Mist mischen und auf ganz gleichmäßige Verteilung achten. Monotonie soll aber auch hier der Dünger nicht obenaufliegen bleiben. Sonst zerfallen die festen Bestandteile des Düngers nicht mehr genügend bis zur Saat- und Pflanzzeit.

Das Umpfropfen von Kirschbäumen.

Auch bei Kirschbäumen kommt es vor, daß die Sorten den berechtigten Ansprüchen an Größe und Güte der Früchte und regelmäßigen Ertrag nicht genügen. Mancher Besitzer solcher Bäume glaubt, die beim Kernobst häufig angewendete Maßnahme des Umpfropfens sei hier nicht möglich. Diese Ansicht haben gute Erfahrungen, die man bei Kirschbäumen in vorgerücktem Alter mit Umpfropfen gemacht hat, widerlegt. Sofern die Bäume gesund und kräftig sind, lohnt sich das Umpfropfen durchaus. Im dritten Jahre pflügt die Tragbarkeit schon wieder einzutreten.

Da ältere Kirschbäume gewöhnlich mehr Kronenäste besitzen, als man zum Wiederaufbau der Krone benötigt, ist es aus mancherlei Gründen vorteilhaft, die Bäume schon im Jahre zuvor für das Umpfropfen vorzubereiten. Man sägt deshalb zunächst alle Äste heraus, die nicht zum Aufbau des neuen Kronengerüsts gebraucht werden, damit dem Baum beim Umpfropfen, das auf das nächste Jahr verschoben wird, nicht unnötigerweise Wunden zugefügt werden müssen und die durch das Ausschneiden der Äste entstehenden Wunden schon vorher verheilen können. Durch solches Ausschneiden wird die Arbeit des Umpfropfens außerordentlich erleichtert, weil für später nur das eigentliche Abwerfen der Krone übrig bleibt.

Dies ist bei dem Umpfropfen älterer Kirschbäume ohne Zweifel die wichtigste Arbeit. Man kann dabei nicht nach einem bestimmten Schema verfahren, weil der Wuchs der Bäume und die dadurch geforderten Formen der Krone verschieden sind. Man strebe danach, der Krone eine pyramidale Form zu geben, lasse die unteren Äste möglichst lang und benutze auch die an diesen Ästen vorhandenen Nebenzweige zum Aufsehen von Edelreisern. Die oberen Äste halte man dagegen kürzer, und zwar stets so, daß die unteren Pfropfpunkte nicht unter die Traufe der oberen zu stehen kommen. Dadurch wird erreicht, daß die Krone bald wieder ihre natürliche Form erhält, das untere Astgerüst also nicht erst wieder aufzubauen braucht, die aufgesetzten Edelreiser unter dem belebenden Einfluss von Luft und Licht sich auch gut entwickeln und die Tragbarkeit früh einsetzt.

Die Fütterung der Kühe im Stall.

Wenn die Arbeit auf dem Felde ruht, dann muß der Landwirt seine volle Aufmerksamkeit der Fütterung und Pflege der Tiere im Stall widmen. Dies ist um so notwendiger, als die Winterfütterung gewöhnlich weniger einfach als die Sommerfütterung ist. In einem gutgeführten Rindviehstall werden die Futterzeiten genau eingehalten. Jede Mahlzeit muß vollständig verdaut sein, ehe eine neue folgt. Sonst wird der Magen der Tiere geschädigt. Die nächste Mahlzeit darf aber auch nicht länger auf sich warten lassen als notwendig ist, damit die Tiere nicht unruhig werden und dann mit Haß fressen.

Die Zahl der täglichen Mahlzeiten ist verschieden. In kleineren Betrieben gibt man meist drei, in größeren zwei. Kurz geschnittenes Futter verabreicht man in kleinen Mengen, damit es die Tiere rasch aufessen und nicht erst durch ihren Atem erwärmen. Bevor frisches Futter in den Trog gegeben wird, muß dieser geleert sein. Dort, wo man größere Mengen weniger schmackhaften Rauhfutters mit zartem, wohlwärmendem Futter mischen will, ist das Schneiden zu Häufel zu empfehlen. Im übrigen gibt man das Rauhfutter ungeschnitten. Es regt die Speichelausschüttung an und fördert dadurch die Verdauung. Von langem Futter braucht man weniger als von geschnittenem, und es ist den Tieren möglich, schädliche Stoffe wie grobe,

Zubereitungsmethoden für das Schweinefutter.

Von Franz Neuling.

Die meisten Futtermittel, die sich für Schweine eignen, bedürfen einer besonderen vorbereitenden Verarbeitung, um gut verdaulich zu werden. Roh und unzerkleinert werden sie von den Tieren entweder überhaupt nicht angenommen oder sie bringen doch viel zu geringen Nutzen. Die am meisten angewandten Zubereitungsarten der Futtermittel bestehen in Zerkleinerung, im Quellen und Kochen. Zu dem Zerkleinern rechnen wir das Schneiden des Grünfutters, das wir den Schweinen verabreichen. Auf solche Weise können wir jede beliebige Mischung mit dem Grünfutter herstellen, die Tiere fressen das geschnittene Futter schneller, außerdem geht weniger davon verloren. Ebenso dient das Schneiden oder Mahlen von Kernen und Rüben dazu, den Tieren das Fressen zu erleichtern. Wir sollen das Futter erst kurz vor jeder Mahlzeit schneiden, im anderen Falle wird es weilt und die Tiere fressen es dann nicht gern. Außerdem wird das Häufel des Grünfutters bei längerem Lagern leicht heiß, und in solchem Zustand kann es den Schweinen leicht schädlich werden.

Die Körner der Getreidearten und Hülsenfrüchte schrotet und quetscht wir. Alle diese Körner sind in reifem Zustand sehr hart, die notwendige Folge davon ist, daß sie von den Tieren nur unvollkommen verdaulich werden; mehr als die Hälfte geht auf diese Weise ungenutzt ab. Durch das Quetschen und Schrotet machen wir die Körner dem Verdauungsprozeß zugänglich. Die Stärkemehlfrüchte jedoch können von den Verdauungssäften nur dann vollständig gelöst werden, wenn sie vorher eingeweicht oder mit heißem Wasser abgerührt werden. So können wir mit wenig geschroteten und abgerührten Körnern eine ebenso große Wirkung erzielen, wie mit einer viel größeren Menge ungeschrotener Körner. Auch der Mais, den man vielfach unzerkleinert vorwirft, würde in geschrotetem Zustande viel besser verwertet.

Manche Futtermittel quetschen wir noch auf, so namentlich Körner und Hülsenfrüchte. Durch Einweichen und längeres Siebenlassen in kaltem oder warmem Wasser lösen sich die schwerverdaulichen Nährstoffe wenigstens teilweise. Auch durch Dämpfen und Kochen machen wir viele Futtermittel verdaulich.

harter. Harte Schalen werden dadurch gesprengt, bläuhende Stoffe ihrer nachteiligen Wirkung beraubt, die Stärkekörper quellen und werden dadurch löslicher.

Damit erreichen wir bei vielen Futtermitteln höhere Ausnutzung. Vom Gewinn ist allerdings der Aufwand für Heizstoffe und Arbeit abzuziehen. Man darf aber nicht nur günstige Wirkungen von solchen Zubereitungsmethoden erwarten. Das Erweich z. B. wird durch das Kochen unverdaulich. Futterstoffe, die vorwiegend diesen Nährstoff enthalten, sollten wir deshalb nicht kochen. Andererseits empfiehlt es sich, auch auf die Nahrungszugabe der Schweinehaltung Rücksicht zu nehmen; treiben wir ausschließlich Schweinemast, so machen wir vom Kochen möglichst weitgehenden Gebrauch, treiben wir Zucht, so sparen wir uns diese Arbeit, wo es geht.

Nach dem Dämpfen und Kochen werden Rüben und Kartoffeln zerkleinert, zerstampft oder besser gequetscht, so daß die bereits aufgequollenen Stärkemehlkörner vollständig beritten. Es entsteht dann ein Brei, den die Tiere gern aufnehmen. Ihn vermengen wir mit anderen Futtermitteln, und so erhalten wir eine Futtermasse, die den Schweinen sehr bekömmlich ist. Stärkemehlfuttermittel, wie Früchte, Samen, Kleie und namentlich Kartoffeln säuern wir auch mitunter an. Dadurch führen wir einen Teil des Stärkemehls in Zucker über, einen anderen in Stärkeregummi und machen sie leichter verdaulich. In diesem Zweck dämpfen wir die Kartoffeln zuerst, zerquetschen sie fein und rühren den Brei in noch warmem Zustande mit Schrot, Mais und Kleie unter Zusatz von heißem Wasser tüchtig durch. Der so entstehende Brei ist sehr nahrhaft und wird von den Tieren sehr gern aufgenommen. Nach dem Erkalten lassen wir ihn 1–12 Tage stehen. Es beginnt dann die Bildung von Milchsäure, und in diesem Zustande wird die Futtermasse von den Tieren am liebsten aufgenommen. Das angesäuerte Futter nützt die Schweine im höchsten Grade aus. Bei der Fütterung von Sauerkraut ist jedoch die größte Reinlichkeit in Futtertrögen und Futtergefäßen notwendig. Sonst schreitet die Fäulnis in ihrer Säurebildung weiter, es bildet sich Essigsäure, der Nährwert des Futters sinkt dadurch und es kann sogar gesundheitsschädlich für die Tiere werden.

holzig Stengel und dergl., auszufordern. Reicht man das Stroh nicht zum Durchstreifen, wobei das Hind alles, was genießbar ist, wie Grashalme, Blätter, Weizen, zu sich nimmt, sondern verwendet man es zur Herstellung eines Gemisches von geschneittenen Rüben, Kraftfutter usw., so muß man es schneiden.

Im allgemeinen beachte man bei Aufstellung der Futterordnung, daß Mannigfaltigkeit der Futterstoffe das Futter schmackhaft macht. Senf und Grammel reinigt man vor dem Füttern durch Schütteln von Staub, wemöglich bei kräftigem Durchkneten. Zur Anregung der Fresslust und der Absonderung der Verdauungssäfte bekommen die Tiere auch Rohkost. Es macht weniger bekömmliches Futter schmackhaft und ist namentlich bei Wurmgewürmen unentbehrlich. Ein Rind braucht täglich etwa 40 Gramm, ein Pferd 25, ein Schwein 8 und ein Schaf 6 Gramm. Heberman verlangt die Tiere zu Wasserzufuhr, die ungesund ist. An Phosphorsäure und Kalzium armes Futter verbessert man durch Beigabe von phosphorsäurem Futterkalk. Phosphorsäure Kalk dient zum Aufbau der Knochen und wird namentlich von wachsenden, kräftigen und mähenden Tieren gebraucht. Reich an Kalk pflegen die Seeratten, die Körner und das Stroh der Hülsenfrüchte zu sein, reich an Phosphorsäure die Getreidekörner, Delfisch und Fischmehl. Kalk allein gibt man in Form von Schleimkreide, 4 bis 10 Gramm pro Tag und Kopf.

Die Tuberkulose im Hühnerhof.

Eine der gefährlichsten und verbreitetsten Geflügelkrankheiten ist die Tuberkulose. Es gibt wohl kaum ein Hühnervolk, in dem sie nicht zeitweise und vereinzelt auftritt. Um rechtzeitig dagegen einschreiten zu können, muß man mit ihren Erscheinungen vertraut sein. Geheilt werden können kranke Tiere nicht, aber der Ausbreitung des Leidens kann man vorbeugen. Räumert man sich nicht darum, dann kann der ganze Bestand verendet werden, denn es handelt sich um eine ansteckende Krankheit. Die Ansteckung vollzieht sich meist durch den Kot der erkrankten Tiere.

Die Tuberkulose nimmt wie überall so auch beim Geflügel meist einen schleichenden Verlauf; das Tier kann an den inneren Organen schon längst erkrankt sein, ehe man ihm äußerlich etwas anmerkt. Ganz sicher kann man die Krankheit äußerlich jedoch auch nicht erkennen, weil andere innerliche Erkrankungen ähnliche äußerliche Erscheinungen zeitigen. Sicherer Aufschluß gibt nur die Untersuchung der inneren Körperteile, aber verdächtig der Krankheit sind die Tiere, sobald sie ein schwaches, trauriges Benehmen kundgeben, betrübt mit eingezogenem Kopf und etwas gesträubtem Federkleid herumstehen, sich langsam und träge bewegen, beim Füttern zwar gut fressen, zum Scharrten und Futterfressen aber zu faul sind, dabei immer mehr abmagern und keine Eier legen. Die Augen sind wohl klar, erscheinen aber eingesunken, Ramm und Rappen sind blaß, bläulich und schlapp, die Schleimhäute der Augen und Schnabelhöhle sind bleich; auch Lahmheit und Beinwackeln zeigt sich manchmal, infolge tuberkulöser Erkrankung der Gelenke und Knochen. Zuweilen kommen auch tuberkulöse Knoten und Beulen in der Haut, namentlich am Kopfe, vor. Alle diese Erscheinungen treten allmählich immer schärfer hervor, zuletzt stellt sich Durchfall ein und dann ist das Ende nicht mehr fern. In diesem Zustande ist auch die Gefahr der Ansteckung für die anderen Hühner am größten.

Am häufigsten sehen sich die Tuberkulosebakterien bei den Hühnern in der Leber fest, in der Milz, den Därmen und dem Geflügel, seltener in den Lungen, Nieren und dem Eierstock. Die tuberkulösen Bildungen wachsen sehr in der Größe, von kleinen Punkten bis zur Größe einer Erbse, sie können in großen Haufen beisammen liegen und schließlich das ganze Organ vollständig verändern. Ihr Aussehen ist gelblich weiß, die Knoten oder Tuberkeln fallen in der Mitte zusammen, und wenn sie an den Därmen oder im Eierstock liegen, so werden unangenehm Tuberkel-

bakterien mit dem Dung ausgeschieden. Ist nur der Eierstock von der Tuberkulose ergriffen, dann können die Tiere noch lange gut und gesund aussehen, nur legen sie keine Eier, bis die Krankheit auch auf andere Organe übergreift.

Sobald man ein Tier oder mehrere mit den geschilderten äußeren Krankheitsercheinungen unter dem Federkleid bemerkt, soll man es schlachten und einem Tierarzt zur Untersuchung zeigen, und erhält man den Befehl, daß die Krankheit Tuberkulose ist, so soll man unverzüglich den Stall und alle Stallgeräte gründlich reinigen und desinfizieren. Danach muß man noch lange ein scharfes Auge auf die Tiere haben und sie genau beobachten, und sobald sich ein, auch nur leicht verdächtiges Fühn zeigt, es sofort töten und verbrennen. Die Desinfektion des Stalles ist zu wiederholen, wenn neue Krankheitsfälle auftreten.

Nützliche Mitteilungen.

Vom Winterschutz der Rosen. Der Veredelungsstelle ist beim Einwintern der Rosen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Deckt man nur leicht, dann liegt sie nur kurzer Zeit ganz frei, dem Wetter preisgegeben, denn die Decke, die gegen harte Angriffe des Frostes noch immer das beste Mittel sein dürfte, steht sich innerhalb einiger Wochen, zumal bei längerem Regen, ganz gewaltig. Daher sollten wir unsere gedekten Rosen zuweilen daraufhin ansehen. Oft genügt eine Handvoll weiterer Erde, drohendes Unheil abzuwenden. Zu stark will die Veredelungsstelle hinwiederum auch nicht verwahrt sein. Buschrosen, die begehrt sind, brauchen nicht außerdem mit Nadelreisig dicht befestigt zu werden. Die Zweige wollen Luft. Vor dem Niederlegen der Hochstämme binde man die Krone mit Weiden zusammen, und bei schwachen Stämmen und Kronen binde man noch einen Stab, der bis in die Krone reicht, etwa von der Dicke des Stammes, an diesen. Geschieht dies nicht, so werden beim Herausnehmen im Frühjahr leicht Zweige, wenn nicht die ganze Krone, abgebrochen. Um auch bei Frostwetter die Rosen in die Erde bringen zu können, ist diese vorher mit Laub oder Streu zu belegen, um sie offen zu halten. Wo das Eingraben nicht möglich ist, geben Tannenzweige ein vorzügliches Deckmittel. Beim Niederlegen der Stämme nehmen man Bedacht, daß auch diese geschützt werden. Sie leiden eher durch Frost als durch aufsteigende Feuchtigkeit. Gefrorene Stämme dürfen nicht umgebogen werden. Sie brechen ab. Man lege deshalb die Hochstämme rechtzeitig nieder und bedecke sie später beim Eintritt der Kälte.

Gehölze im Einslag. Wer im Herbst Obstbäume oder Sträucher von auswärts bezieht und zum Pflanzen nicht gleich die nötige Zeit findet, wird sie in üblicher Weise einslagen. Dabei denkt man gewöhnlich in einigen Tagen pflanzen zu können, oft aber liegen die Pflanzen dann viel längere Zeit im Einslag, als ursprünglich geplant war und es kann vorkommen, daß plötzlich Frost eintritt und die Pflanzen bis zum Frühjahr im Einslag bleiben müssen. Hat man nun die Wurzeln nur flüchtig mit Erde bedeckt, dann leiden die eingeschlagnen Pflanzen an Trockenheit, weil sie zu locker im Boden liegen. Man sollte sich daher beim Einslag der Pflanzen die kleine Mühe machen, die Wurzeln der Gehölze in einen Rehmbeiz zu tauchen und im Einslag einzuschlämmen und anzutreten. Da die Wurzeln hier dicht zusammen liegen, läßt sich das Einschlämmen mit einigen Kanne Wasser sehr schnell durchführen. So eingeschlagnen nehmen die Pflanzen keinen Schaden, selbst dann nicht, wenn sie erst im Frühjahr gepflanzt werden können.