

Für Familie und Haus.

Gesundheit.

Mittel gegen Fleder. Von Kaffee: Cyperein und Nachschaffen mit lauwarmem Wasser. — **Wasserkur:** Verbünnte Weinsäure; je älter der Fleder, desto stärker die Lösung. Vorher prüfen, ob die Farbe des Stoffes es gestattet; bei gelber Färbung oder Benzol. — Gallustinte und Kaffee: Einige Tropfen von einer Salzlösung auf den Fleder, dann Auswaschen mit kaltem Wasser; bei gelber Färbung. — **Stoßkaffee:** Bei Wollen- und Baumwollzeug: Seifenwasser mit etwas Pottasche; bei Seiden verdünntes Chlorwasser, dann nachspülen. — **Essen:** Brotkrumen mit starkem Weingeist. — **Desinfizieren:** Kirschen, Daz: Geruchloses Terpentinöl, Benzol, neuzugestrichene Epoxidharz, dann Seife. — **Feuer:** Benzol, dann mit stark verdünnter Salzsäure und später mit Seifenwasser nachgewaschen. — **Essen:** Rohwein, rote Tinte, Pfefferkörner, Gerbstoffe von Leder, grünen Nusschalen, Tee, Kaffee und sonstiger: bei Seiden Schwefelwasser, heißes Chlorwasser, Nadeln mit grüner Seife, Bleichlauge, starke Lösung von Weinsäure; bei Baumwolle, Wolle und Seide laues Seifenwasser oder verdünnter Essigsäure. — **Gerüche von Gerbstoffen:** ausgenommen — gegen letztere je nach Art des Stoffes und Farbe mehr oder weniger verdünntes heißes Chlorwasser tropfenweise auf den unangenehmsten Fleck, dann mit Wasser nachspülen. — **Gerüche aus Papier:** auch veraltet: Benzol, Magnesia ausschütten, mit dem Finger aufreiben, dann abklopfen; aus Holz: Benzol.

Ein Mittel gegen Brotstimmeln. In Landhauskulturen, wo man gewöhnlich größere Mengen Brot auf einmal backt, pflegt letzteres im Sommer oder bei Aufstreuung im Keller leicht schimmelig zu werden. Als erprobtes Mittel gegen diesen Uebelstand empfiehlt es sich, das frisch gebackene Brot, sobald es aus dem Ofen kommt, in einen Wehlack zu tauchen, in welchem noch etwas Mehl zurückgelassen ist, und zwar so, daß die Oberbrinde des Brotes aufeinander zu liegen kommen. Hiernach bindet man den Sack zu und hängt ihn an einem luftigen Orte feilzubehalten auf. Auf diese Weise läßt sich das Brot vier bis sechs Wochen aufbewahren, ohne trocken zu werden, oder auch nur eine Spur von Schimmel anzunehmen. Vor dem Gebrauch legt man es eine Nacht in den Keller, damit es wieder geschmeidig wird.

Bergblau Wäsche zu bleichen. Kalenbleiche ist jedenfalls das vorzüglichste Mittel, um die Wäsche schön weiß zu machen, aber für die Wintermonate, und da, wo keine Bleiche zur Verfügung steht, wende man folgendes Mittel an: Wenn die Wäsche nicht gestärkt werden soll, dann lege man dem Blauwasser, sonst aber der Stärke, eine Mischung von drei Teilen gutem Spiritus und 1 Teil weissem Terpentin zu und zwar rechnet man auf einen Eimer Blauwasser oder Stärke 2-3 Schöckel voll von dieser Mischung. Wenn möglich, treibet man die Wäsche im Freien, oder auf einem hellen, luftigen Boden, damit das Licht einwirken kann. Die Wäsche wird schön, klar und weiß, vollständig geruchlos und wird in keiner Weise angegriffen, wie dies bei der hier und da üblichen Chlorbleiche der Fall ist. — Sehr feine Wäsche, welche durch feines Siegen schon ganz weiß und fleckig geworden ist, legt man in Buttermilch und läßt sie darin, je nachdem es erforderlich ist, liegen, wenn nötig, erneuert man die Milch. Bei feinen Spitzen, Mull, Stiderein usw. darf die Milch nicht zu sauer sein. Darauf wäscht man die Wäsche gut aus mit Seife, spült sie und läßt sie ebenfalls mit einem Zusatz von Spiritus und Terpentin, wie bereits angegeben.

Gesundheit.

Zum Brongieren von Holz, Steingut, Porzellan, Silber oder Silberwaren ist eine nicht zu verdrüßliche Wasserlösung das geeignetste Mittel. Man braucht dazu nur den betreffenden Gegenstand mittels eines feinen Pinsels ganz dünn mit der Wasserlösung zu bestreichen und unmittelbar darauf das in einem mit feiner Gaze überbundenen Glas mit weicher Mündung befindliche Brongierpulver aufzustreuen, den Überschuß des Pulvers durch schwaches Klopfen vom Gegenstande zu entfernen und ihn hierauf, falls der brongierte Gegenstand aus Porzellan oder Steingut besteht, schwach zu erwärmen.

Delbrücker reinigt man, indem man das Bild aus dem Rahmen nimmt und leicht mit einem in lauem Wasser, dem man ein paar Tropfen Salzwasser beigefügt hat, getauchten Schwamm überwischt. Dann nimmt man etwas Wasser, Sandzucker und Gummiarabikum zu gleichen Teilen, gibt einige Tropfen Vermutrinlösung hinzu und trägt diese Mischung mit einem weichen Lappchen gleichmäßig auf das Bild auf.

Am Rost von nadelplattierten Artikeln zu entfernen, läßt man dieselben einige Tage lang mit Fett bedeckt liegen, dann reibt man sie gut mit Ammoniak ab. Ist der Rost tief, dann bediene man sich einer opasäuren Lösung oder verdünnter Salzsäure, welche man auf den Rostflecken, aber nur einen Augenblick, lassen darf. Man wäscht mit Wasser und Schwamm ab und poliert mit englischem Tripel oder Polierrot. Das wiederholte man, so oft es nötig ist.

Wasserschuppen gegen Sommerprossen. Sommerprossen lassen sich nicht gänzlich vertreiben, wohl aber entzünden. Feingeriebener Meerrettich in einer Glasflasche mit scharfem Weinessig übergossen und so 24 Stunden wogelverfärbt stehen gelassen, wird mit Erfolg angewendet. Bestreicht man die Sommerprossen hiermit vor dem Schlafen, so werden dieselben nach ungefähr vierzehntägigem Gebrauch fast ganz verschwunden sein. Zum Verschwinden kommen die Sommerprossen alle Jahre wieder, worauf man wieder zu derselben Kur schreitet.

Gesundheitspflege.

Kopf kühl, Füße warm, macht die Vektoren arm. Dieses Sprichwort verdient sehr Beachtung. Statt der Pelzmütze und den dicken Haistüchern, die das Blut nach dem Kopfe leiten und verweilen, Erfrischungen, Husten, Fieberfrost und Halsweh zur Folge haben, verwende man keine Sorgfalt mehr auf gute Fußbekleidung, wechsele feuchte Strümpfe und verbinde die kalten Füße.

Blutvergiftung durch beim Anbrennen abspringende Streichholzspitzen, die in Schnitte oder Risse an den Händen geraten, lassen sich durch eine lauwarme Lösung von einfach kohlensaurem Natron (gewöhnliche Waschlauge) leicht beseitigen. Die verletzte Stelle wird 10 Minuten in dieser Lösung gebadet. Ist das Baden nicht möglich, so mache man Umschläge, die mehrmals erneuert werden müssen. Ist einfaches Natron nicht zur Stelle, so darf doppeltkohlensaures Natron und im Notfall sogar Kochsalz verwendet werden.

Medizinische Eigenschaften der Gemüse. Spinat soll eine direkte Wirkung auf die Nieren haben, ebenso Kürbiskern, grüne gekochene Spargeln reinigen das Blut, Sellerie wirkt besonders auf das Nervensystem und heilt Rheumatismus und Neuralgien. Tomaten sind gut für die Leber. Gelbe und weiße Rüben reizen den Appetit, Lattich und Gurken wirken kühlend. Knoblauch und Oliven besitzen markante Kräfte, sie stimulieren (regen an) die Blutcirculation und vermehren die Absonderung des Speichels und Magensaftes. Rote Zwiebeln sind ein ausgezeichnetes harntreibendes Mittel, Zwiebeln überhaupt sind ein vorzügliches Heilmittel bei Schwächezuständen des Verdauungsorgans.

Kindernpflege und -Erziehung.

Beim Baden der Säuglinge dürfen die Ohren niemals mit eingetaucht werden. In die Gehörgänge gelangendes Wasser kann Entzündungen hervorrufen.

Bei Blutungen nach Zahnziehen spüle man die leere Zahnhöhle mit abgekochtem heißem Wasser aus.

Schreckhafte Kinder schlafen nachts besser beim matten Schein einer Nachlampe als in völliger Dunkelheit.

Bei lästiger Neigung zu Blähungen gebe man einen aus Pfefferminzblättern, Kamillenblüten und Weizenblättern zu gleichen Teilen zusammengelesenen Tee.

Ich möchte behaupten, so manches Angstdämon würde nicht geschehen, wenn man selbst kleine Kinder mit den Gefahren bekannt machte, von denen sie bedroht sind, und dazu gehört die eigene Erfahrung des Kindes, ohne welche all unser Reden und Ermahnen, alles Warnen und Strafandrohen wirkungslos bleibt. Wir können dem Kinde noch so oft sagen, daß Streichhölzer, Lampen und Feuer heiß sind und Schmerzen verursachen, es wird dies wieder vergessen haben, wenn es nicht einmal dabei in Berührung kommt. Hat es sich aber am heißen Ofen, am heißen Lampenglas oder u. u. nur einmal seine zarten Fingerglieder verbrannt, dann wird es ihnen weit aus dem Wege gehen, „gebranntes Kind scheut das Feuer“. Ebenso verhält es sich mit Schere, Gabel, Messer, Nadel usw.

Man lerne dem Kinde von frühester Jugend an, daß nicht alles, was es begehrt, ihm auch erreichbar ist und lasse es dann und wann fühlen, wie sehr dieser und jener Gegenstand, der seine Begierde reizt, verwunden kann. Nur dann wird es vor Waghalsigkeiten bewahrt, wird manches Angstdämon vermieden.

Die Strophulose der Kinder und ihre Gefahren. Der Strophulose der Kinder wird von Seiten der Mütter vielfach nicht die erste Beachtung geschenkt, die diese Krankheit so außerordentlich erfordert. Handelt es sich doch bei ihr nicht nur um einen vorübergehenden Krankheitszustand, wie manche Mütter meinen, sondern um eine Disposition zur Tuberkulose. Wird sie also nicht in einigebender, entsprechender Weise behandelt und der Körper des Kindes vor ihr bewahrt, so wird die Folge der Bemerkungslässigkeit unbedingt in späteren Jahren die Tuberkulose in mehr oder weniger schwerer Form sein.

Strophulose Kinder sind schwache Kinder. Das Hauptaugenmerk bei ihrer Behandlung muß deshalb in erster Linie auf Kräftigung des gesamten Organismus hingelen. Diese wird erreicht durch ausgebreitete Körperpflege und sorgsam zusammengehaltene Diät. Die Körperpflege selbst muß in täglichen Abreibungen und öfteren Solbädern bestehen. Die ersten befähigen die Haut zu einer ausgebreiteten Ausdünstung, die letzteren üben einen sehr wohltätigen Reiz auf den Körper aus und tragen zu einer Kräftigung bei. Die Diät sollte fleisch, wenn irgend möglich, ausschließen, dafür kühlende und leichtverdauliche Speisen als da sind: Salate, Milch- und Reispeisen, Möhren, Kartoffeln, Makkaroni, Haferspeisen und Obst, vor allem Dingen in gekochtem Zustand, umfassen. Um die Brust zu weiten und Tiefatmung zu ermöglichen, sollten weiter entsprechende Turnübungen ausgeführt werden. Eine ganze Reihe gymnastische Übungen, speziell die Ausdehnung der Lungen bezweckend, sollte sich die Mutter derartiger Kinder vom Arzt verschreiben lassen.

Reaktion: Dr. K. K. K. in Berlin a. A.

Der Praktische Ratgeber

für Landwirtschaft und Tierzucht,
Obst- und Gartenbau
Familie und Haus.


Beilage zur
Sauerländer Zeitung
Druck und Verlag von Hans Albrecht, Brilon.

Nr. 9.

Schwarze Italiener.

(Nachdruck verboten.)

Die heute unter dem Namen „Italiener“ gezüchteten Rassen führen ihren Namen eigentlich zu unrecht. Für den Ursprung der reingezüchteten Italiener dürfen wir die Quellen nicht in Italien suchen. Dieses Land hat einst nur das grundlegende Material geliefert. Unsere heutigen Italiener verdanken den Amerikanern ihren eigentlichen Namen. Von Amerika kamen sie nach England, wo sie weiter, namentlich in Form und Farbe, vervollkommen wurden. In Deutschland wurde dann mit eingeführtem Material aus England und Amerika die Zucht aufgenommen und auf eine Stufe geführt, die den beiden genannten Ländern an nichts mehr nachsteht, so daß wir heute auf Importen verzichten können. Unsere eigenen Erfolge reichen vollkommen aus, das Italienerhuhn auf der Höhe zu halten und, wo es tunlich erscheint, weiter zu vervollkommen.



Von allen verschiedenen Rassen, mit denen Deutschland in den letzten Jahrzehnten überschüttet und heimgesucht wurde, haben die Italiener die weitest verbreitetsten gefunden, und das mit Recht. Gibt es doch kaum ein anderes Huhn, welches für den Landbewohner so viele Vorteile in sich vereint, als gerade das veredelte Italienerhuhn. Es ist darum auch nicht verwunderlich, daß

es wohl kein Dorf mehr gibt, in dem dieses Huhn nicht rein oder zum mindesten mit den vorhandenen Landhühnern gekreuzt zu finden wäre. Ihr hauptsächlichster wirtschaftlicher Wert liegt in der Eierproduktion, in der sie im Durchschnitt von keiner anderen Rasse übertroffen werden.

Die allgemeine Beliebtheit und weite Verbreitung hat dann auch dazu geführt, daß die Italiener in den verschiedenen Farbschlägen gezüchtet werden, damit jeder seinem Geschmack Rechnung tragen kann. In wirtschaftlicher Hinsicht stehen aber die verschiedenen Farbschläge einander gleich. Unsere beigegebene Abbildung zeigt den männlichen Vertreter des schwarzen Farbschlags. Hauptfärbung bei diesem Farbschlag ist tief-schwarzes, glanzglänzendes Gefieder. Gerade diese Färbung ist aber bei fettgelben Beinen, milchweißen Ohrschellen und hochrotem Gesicht und ebenförmigen Kehllappen nicht sehr leicht zu erreichen. Bei sonst tadelloser Gefiederscheitel lassen die Ohrschellen meistens zu wünschen übrig; etwas gelblichen Anflug darf man bei diesen wohl durchgehen lassen, niemals aber Schwefelgelb. Violetter Anflug im Gefieder ist stets ein Zeichen von Degeneration. Solche Tiere sind daher von der Zucht auszuschließen, ebenso solche mit grünlicher Beinfarbe. Im Gefieder darf sich auch keineswegs rufbraun oder dunkelbraun bemerkbar machen. Hochgraues Untergefieder, wie es nicht selten vorkommt, ist fehlerhaft.

Bessere Feld- und Gartenbearbeitung.

Aus der Praxis für die Praxis.

Von Gutshauptmann H. u. b. - Wiesloch.

(Nachdruck verboten.)

Je mehr aus einem Stück Land bei rationeller Anwendung von Arbeit und Düngemittel herausgeholt werden kann, um so höher stellt sich der Reinertrag. Soweit es in den Kräften aller derjenigen steht, ob Feld oder Gartenbesitzer, sollten sie nach Möglichkeit unter Anwendung aller gegebenen Mittel die Produktion zu steigern suchen. Daß dies in vielen Fällen möglich und in der heutigen Zeit notwendig erscheint, bedarf keiner weiteren Erklärung. — Hier sollen nur kurze Andeutungen über bessere Feld- und Gartenbearbeitung folgen. Höchsterträge sind nur möglich bei einer intensiven Düngung und Bodenbearbeitung, was sich gerade im letzten Jahr wieder deutlich bewiesen hat. Tiefgepflügte, gut gedüngte Felder haben bei der großen Trockenheit noch recht gute Ernten gebracht. Überall konnte man Bestände von schlecht und gut gepflügten Feldern sehen. Daß sich hier die Mehrerträge noch lobt, wird wohl nicht bezweifelt werden. — Je nach der Frucht soll Stalldünger oder der nötige Kunstdünger gegeben werden. Auf feuchten Böden darf es an der Düngung fehlen, da gute Düngung bei richtiger Anwendung sich in jedem Vorzuge

zu verfahren (b. h. ihn müde und loder zu machen) muß vor allen Dingen vor dem Winter gepflügt werden. Ist der Boden gut durchgepflügt, also rechtzeitig gepflügt, ist ein Pflügen im Frühjahr nicht mehr nötig, im Gegenteil wird durch das Frühjahrspflügen mit der Bodenfeuchtigkeit verschwendet. Man bedenke, daß die gewendete Ackerfrucht von der unteren Bodenschicht getrennt wird, wodurch der Wind besser eindringen und alle Feuchtigkeit entziehen kann. In den meisten Fällen wird der Boden noch feucht gepflügt, so daß sich bei mittleren und schwereren Böden Schollen bilden und der leichte Boden glatte Strukturen bilden. Besser ist es, den Acker, sobald er an der Oberfläche abgetrocknet ist, abzufahren, nach einiger Zeit mit einem Kultivator durchzuführen, andernfalls gut durchzuwegen. Nicht überall ist es möglich, so zu verfahren, daß man zwei- und dreimal auf denselben Acker fährt, bis die Saatfrucht im Boden ist. Wo es aber einigermassen angängig, sollte man schon wegen der Verflüchtung des Stickstoffes, das in der Zeit zwischen Acker und Gegenfeld, vor der Saat noch durchfahren. Das gleiche Verfahren gilt auch für den Gartenboden, den man im Frühjahr noch in den meisten Fällen umgraben mit vorjährigen Pflanzensummen leben kann. Selbst dann, wenn der Winter noch ungegraben wurde, wird vor der Gartenarbeit nochmals umgegraben. Warum, ist mir unerklärlich; allein doch nicht um sich Arbeit zu verschaffen? — Nützen bringt wohl diese Mehrarbeit nicht. Hier geht man in gleicher Weise vor, wie es für den Landwirt mit größeren Feldstücken geboten erscheint. Sobald der Gartenboden genügend abgetrocknet, wird er durchgegratet und nach einigen Tagen, bevor man ihn nochmals leicht durchgegratet und durchgereicht. Empfehlenswert ist auch in der Gartenkultur, mehr die Reihenweite einzuführen, wie es sich in der Landwirtschaft schon längst als praktisch erwiesen hat. Durch Anwendung der Reihenweite läßt sich gleichzeitig die Mischaat verbinden, die viele Vorteile bringt. So kann Mohr mit Gelberüben, Erbsen mit Gelberüben, Gelberüben mit Zwiebeln und andere Samen mit einander in eine Reihe gesät werden. Nach Abreingung der ersten wird man der zweiten Frucht eine Stickstoffdüngung geben und eine Pflanzung folgen lassen. Durch diese Anbauweise erreicht man innerhalb bis zwei Ernten. Der Garten und auch der feldmäßig angebaute Boden soll man nach Möglichkeit zu beschaffen suchen. Bis zum Eintritt dieser beschattenden Pflanzengröße soll der Boden loder gehalten werden. Das die die Reihen wird teilweise durch öftere Bodenlockerung gespart. Überhaupt sollte man nach dem Gießen der Boden auslockern, damit sich keine Kruste bilden kann, da er sonst mehr wie zuvor austrocknet. Der Boden immer loder halten, heißt dem Austrocknen

1922.

Wie in der Landwirtschaft von Tag zu Tag mehr die Einsicht kommt, daß mit Stallbügeln allein keine Höchstträge zu erzielen sind, sollten daher auch die Gärtnereiberechtigten anzuwenden. Wenn auch zur Zeit keine Phosphorsäure, die im Thomasmehl und Superphosphat in den Handel kommt, vorhanden ist, so sollte man doch wenigstens Kalksalz und Stickstoff, letzterer in Form von Ammoniak, geben. Eine Weisernte ist sicherlich zu erwarten, zumal wenn eine richtige Anwendung der Düngemittel erfolgt. Die Erträge an Wurzelknollen lassen sich durch Kalk und Stickstoff um das Doppelte steigern, während bei Blattpflanzen im Verhältnis mehr Stickstoff wie Kalk hohe Ernten bringt.

Von Mohrrüben und Karotten (gelbe Rüben).

(Nachdruck verboten.)

Unter allen Wurzelgewächsen nehmen die teils gelb, teils rötlichgelben Mohrrüben und Karotten (auch Mören und gelbe Rüben genannt) eine hervorragende Stelle unter den Futter- und Rüben an. Als letztere sind sie als Beigabe und Hausnahrungsmittel vielseitig nutzbar. Man kann sie roh essen, kochen, einmachen und für sich allein oder mit anderen Früchten (z. B. Kürbis, Quitten, Birnen, Äpfeln usw.) zu schmackhaften und gesundheitsfördernden Gemüsen verarbeiten. In der Futterwirtschaft sind sie namentlich für Pferde eine ausgezeichnete Beigabe von wärmender Wirkung. Kein anderes Gemüse ist so früh und spät zugleich und dabei wirtschaftlich so billig und ergiebig, als Mohrrüben, und bei sachgemäßer Vorratshaltung und durch zu richtiger Zeit gemachte Auslieferung braucht man es zu keiner Jahreszeit entbehren. Und dabei ist ihr gartenmäßiger und selbstwirtschaftlicher Anbau ebenso einfach als lohnend, sie übertreffen hierin sogar noch die Karotten. Denn sie gedeihen überall da, wo überhaupt ein Gemüsebau möglich ist, allerdings auf solchen Plätzen unso besser, wo ihnen eine freie sonnige Lage und ein feuchtgeloderter, sandig-lehmiger, mehr trockener als nasser, humusreicher warmer Boden gegeben werden kann. In schlecht bearbeiteten, festen und nahrungsarmen Böden bleiben die Wurzeln klein und geschmacklos und werden auch in der Form durch entstehende Gabelungen oder Krümmungen verunstaltet. Ebenso ist ihnen auch frischer gedüngter Boden nachteilig; denn einerseits beeinflusst frischer Dünger den guten Geschmack (insbesondere Schweins- und Morbidungen) und andererseits haben die Wurzeln infolge des Fäulnisprozesses des Düngers viel unter Mückenfraß zu leiden. Am lohnendsten und rationellsten ist deshalb ihr Anbau im zweiten Fruchtfolge auf vorjährig gebüngtem Boden. Aber auch von der herrschenden Witterung ist das gute Gedeihen der Wurzeln erheblich abhängig; desgleichen von manchen unangenehmen kulturellen Nebenwirkungen und von der Bodenbeschaffenheit, so daß sie stellenweise trotz aller Mühe und Sorgfalt nicht wachsen wollen, ohne daß hierfür plausible Gründe vorhanden sind. In der Formgestaltung sind die Mören sehr verschieden; auch der Geschmack der verschiedenen Sorten ist abweichend. Von der kleinen, fast kugelförmigen Pariser Karotte, die wegen ihres feinsüßigen Geschmacks und guten Fleisches namentlich für Konservenzwecke beliebt ist, bis zur langen spindelförmigen Rübe sind alle Formen und Größen darunter vertreten. Für Treibzwecke im Mistbeete und zur Frühaussaat im Freien eignen sich am besten die kurztaugigen Karotten, wie beispielsweise „Pariser Markt“ und „Hamburger Markt“, da sie naturgemäß eine kürzere Entwicklungszeit haben als die großwüchsigen Sorten. Da die Wurzeln gegen Frost ziemlich widerstandsfähig sind, so können sie unter Umständen unter einer Schutzbedeckung aus Tomatenresten, Bangstroh usw., den Winter über an Ort und Stelle verbleiben.

Man nimmt bei befeuchtetem offenem Wetter nur immer soviel heraus, als man für die normale Vorratskammer benötigt. Die auf diese Weise überwinterten Wurzeln bleiben erfahrungsgemäß von einem weit besseren Geschmack, als wenn sie im Keller oder in Misten eingelagert werden. G. H.

Wie sind die Ziegen nach dem Ablammen und die neugeborenen Ziegenlammern zu behandeln?

(Nachdruck verboten.)

Ein Zwiegespräch von Dipl. Landwirt Mater-Bohe.

Kommt da der Müller zu seinem Nachbarn und fragt ihn, was nach der erfolgten Geburt mit den Ziegenlammern zu geschehen habe. Bereitwillig belehrt ihn der erfahrene Nachbar: Gleich nach der Geburt soll die Ziege ihre Lammern abdecken, damit sie trocken werden und sich nicht erkälten, hauptsächlich aber, damit das Blut dadurch in Zirkulation kommt. Weshalb wird ja auch gesagt, das Abdecken der Jungen mit einem Strohstück oder einem Wollstück sei besser als das Abdeckenlassen, doch bin ich der Ansicht, daß das Natürlichsie auch das Beste ist. „Da geb ich Dir ganz recht, Du mußt aber wissen, daß es öfters vorkommt, daß das Muttertier das Junge nicht abdecken will, allerdings kann man sich da helfen, indem man das Junge mit Salz bestreut, dann legt sie die Lammern ab.“ meint darauf der Müller. „Ganz recht hast Du, wenn die Lamm nicht leben will, dann streut man etwas auf das Junge, was die Ziege gern abdeckt. Dazu empfehle ich Dir aber Kleie und nicht Salz zu nehmen, da das Salz dem Körper durch seine Wasseranziehung sehr viel Wärme nimmt und dies zu Erkrankungen der Jungen führen kann.“ „Ich habe unlängst einmal gehört, daß die Ziegen die Nachgeburt, wenn sie nicht baldmöglichst entfernt wird, auffressen sollen.“ „Das stimmt, es hat dies aber Krankheiten zur Folge, jedoch man es unbedingt zu vermeiden suchen muß. Dessen kommt es aber auch vor, daß die Nachgeburt gar nicht abgehen will. In diesem Falle ist ein Verabreichen von Pflasterkleie oder sonstigen schleimigen Getränken vorteilhaft. Läßt die Nachgeburt dennoch einige Stunden auf sich warten, so höre man am besten den Tierarzt, den sie dann mittels Eingriff entfernen kann.“ Der Müller gibt sich aber mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden. Er will wissen, wann denn die Nachgeburt normal abgeht. „Normal“, sagt der Nachbar, geht die Nachgeburt in 1 bis 2 Stunden ab, doch kommt es auch nicht selten vor, daß sie schon nach einer Viertelstunde kommt.“ „Noch etwas Nachbar, die Ziege ist doch nach der Geburt recht ermüdet, auch scheint es mir, daß sie sich körperlich sehr ermattet fühlen muß. Kann man denn dem armen Tier da nicht etwas geben, damit es sich rascher erholt?“

„Du hast recht, Müller, die Ziege bedarf nach beendetem Geburtsgeschäft dringend der Ruhe. Um das Tier zu beruhigen kannst Du ihm recht wohl irgend etwas gutes zu naschen geben; ich gebe meinen Ziegen immer eine kleine Schnitte Brot mit Salz. Im übrigen aber laß sie ganz ungestört und erst nach ein paar Stunden, wenn das Tier wieder freiküßt zeigt, gebe ich ihm einen warmen Kleietrank. In Ermangelung von Kleie habe ich während des Krieges bisweilen auch einen Brotsuppe gegeben, doch halte ich den Kleietrank für besser, zumal, wenn das Brot käuflich ist.“ Zu gut darf man es aber in den ersten Tagen des Ablammens mit dem Tiere auch nicht meinen, da große Mengen von Futter leicht zu Verdauungsstörungen, Bauchschwellung oder Durchfall führen können. Ich füttere in den ersten Tagen nach der Geburt zwar gut und kräftig, doch gebe ich das Futter in mehreren kleinen Gaben.“

„Und wie hältst Du es mit den Jungen?“ „Das erste und meiner Ansicht nach allerwichtigste ist, daß ich den Jungen gleich nach erfolgter Geburt den Nabel vorsichtig, aber gründlich mit einer desinfizierenden Flüssigkeit abspüle, z. B. mit Epil-

wasser; auch ein Abklopfen des Nabelendes mit einem in reines Epil eingetauchten Lappchen wird viel empfohlen. Unbedingt notwendig ist es, daß das Junge die Brust oder Kolostrummilch der Mutter erhält. Ich verbringe meine Ziegen zum Ablammen in ein eigenes Stallabteil, wo sie nicht angebunden werden. Dort gehen dann die Jungen schon nach einigen Stunden selbst zum Saufen, oft versuchen sie sogar schon nach 1/2 bis 1 Stunde zu saugen. Allgemein ist zu sagen, daß man unter normalen Verhältnissen vor dem Abgehen der Nachgeburt die Jungen nicht an die Lamm heftungslassen sollte, da dadurch das Abstoßen der Nachgeburt verhindert oder doch erschwert wird. Die Kolostrummilch ist aber unbedingt erforderlich, da durch diese das Darmepithel gelöst und belebt wird. Es kommt dies daher, weil sie viel Magnesiumverbindungen enthält, die abführend wirken. Auch stellt die Milch einen Übergang von der Verdauung zur Nährnahrung dar, so daß Verdauungsstörungen nicht eintreten. Aus dieser Vorsicht der Natur, jeden Futterübergang möglichst allmählich und vorsichtig zu betreiben, können auch wir lernen, daß immer, wo es auch sei, der Übergang von einer Fütterungsart zur anderen langsam zu geschehen hat. Ganz langsam bildet sich die Milch zu Milch mit normaler Zusammensetzung um, weshalb diese vor etwa 8 Tagen nach dem Lammern auch das Kochen nicht vertragen. Doch darüber wollen wir uns ein andermal unterhalten, meine Frau wird so schon zanken, daß inzwischen das Essen kalt wurde. Also leb wohl, Müller!“ Auf Wiedersehen, Nachbar und einen schönen Gruß an Deine Frau; sag ihr nur, Du habest einen Wissensburschen getränkt, dann wird der Marjch, den Du gebeten bekommst, auch nicht so schlimm ausfallen.“ Lebend schütteln sich die Beiden die Hände und gingen auseinander.

Gänsefalle.

(Nachdruck verboten.)

Zur Errichtung von Gänsefallen sind verhältnismäßig nur geringe Aufwendungen erforderlich. Der Gänsefall soll den Tieren ein trockenes Unterkommen bieten. Er muß genügend hell und gut gelüftet sein. Obwohl die Gänse gegen Kälte wenig empfindlich sind, soll aber der Stall doch nicht zu kalt sein, da die Gänse dann zu spät mit dem Regen beginnen.

Der Stall läßt sich in einfacher Weise aus Brettern herrichten, vielleicht in Anlehnung an ein Gebäude oder an eine Mauer. Bei gemauerten Ställen genügt eine einfache Ziegelsteinbreite. Der Fußboden des Stalles muß höher als der Boden des umgebenden Geländes liegen, damit nicht von außen die Mäße in den Stall hineingezogen. Man kann unter entsprechender Aufschüttung den Fußboden als Fußboden wählen. Besser ist ein Fußboden mit Zement- oder Ziegelsteinbelag, der leichter reinzuhalten ist, und der auch Schutz gegen Kälte bietet. Dem Fußboden gibt man etwas Gefälle nach der Türe zu.

Man rechnet auf 1 bis 1 1/2 Quadratmeter Grundfläche 2 Gänse, wobei der Platz für die Regenröhrer inbegriffen ist. Ein Stall mit 4 Quadratmeter Grundfläche bietet reichlich Raum für einen Zuchtstamm von 1 Gänser und 4 Gänzen. Die Höhe des Stalles kann auf 1,80 Meter bis 2 Meter bemessen werden. Die größere Höhe gibt man der Vorderseite des Stalles, so daß das Dach nach hinten zu genügend abfällt. Wenn Stroh vorhanden ist, so nimmt man Stroh als Einstreu. Stroh Streutrost zur Verfügung, so gibt man dem Stroh zweckmäßigerweise eine Unterlage von feiner Torfstreu in der Höhe von 5 bis 10 Zentim. Das Fenster soll sich nach innen öffnen lassen. Man wählt für das Fenster eine Höhe von 80 bis 100 Zentimeter und eine Breite von 50 bis 60 Zentim. In der warmen Jahreszeit kann man in die Fensteröffnung einen mit genügend starkem Maschendraht überzogenen Rahmen einziehen. Die Fenster-


rahmen in warmen Nächten auch nachts offen stehen, wobei die Fenster mit dem Maschendrahtrahmen verwahrt sein müssen. Damit eine ausreichende Lüftung geschaffen wird, bringt man an der Vorderwand oben dicht unter dem Dach eine längslaufende Oeffnung an, die von innen mit Maschendraht bespannt wird. In sehr kalten Winternächten kann die Oeffnung innen durch ein Brett geschlossen werden. Das Dach soll über den Stall vielleicht etwa 30 Zentim. oder noch mehr hinausgehen. An den Seitenwänden braucht das Dach nicht so weit vorzustehen als an der Vorderwand.

Bei 4 bis 5 Gänsen genügen 2 bis 3 Regenröhrer. Die Regenröhrer nur für die Zeit, die für die Regenzeit im Betracht kommt, hergerichtet zu werden. Man stellt sie aus lose zusammengefügten Ziegelsteinen her, wobei man je zwei Steine aufeinanderlegt. Die Zusammenstellung der Ziegelsteine erfolgt derart, daß jeweils innen ein Hohlraum von etwa 1/2 Quadratmeter bleibt. Dieser Innenraum wird dann mit weichem Stroh ausgefüllt.

Zur Vertreibung der Brutflut.

(Nachdruck verboten.)

Auf manchen Geflügelhöfen nimmt jetzt, wo die Sonne höher steigt, die Brutflut der Tiere zum größten Lecker des Züchters vielfach in einem Grade überhand, daß er mit den Glücken nicht ein noch aus weiß und nicht selten die Hälfte des Bestandes auf den Nestern sich herumdrückt. Da sucht mancher dann sich in seinem Lager durch recht barbarische Mittel (Hungertur, Unterfüttern unter eine Kiste, Aufhängen in einen Sad, Untertauchen in Wasser und dergl.) zu helfen, ohne dabei zu bedenken, daß er sich und seinen Tieren dadurch den größten Schaden zufügt. Kein denkender, humaner Züchter sollte darum heute auch nicht mehr an dergleichen Barbareien denken. Ohne direkte Quälerei kann man den Tieren das Glücken abgewöhnen. Man beachte nur, daß man so zeitig als möglich Gegenmaßnahmen ergreift. Jedes Tier, das nach



der gewöhnlichen Legezeit, also gegen Abend, auf dem Neste sitzen bleibt, ist sofort in Behandlung zu nehmen. In der Regel brist schon nach wenigen Tagen das Gluckertier in einen Raum, der hell, luftig, ohne Sitzstangen und ohne Nester und Einstreu ist, möglichst mit einem kalten Zement- oder Steinfußboden, den man in heißen Tagen auch noch öfters mit kaltem Wasser besprengt. Bei reichlich gutem Futter ist die Brutflut schon meist nach 2-3 Tagen verschwunden. Sehr vorteilhaft zur Vertreibung der Brutflut ist auch der freischwebende Kattenkäfig, wie unsere Abbildung ihn zeigt. Die Kattenkäfig hängt man im Hofe in der Nähe der anderen Hühner auf. Bei jeder Bewegung des Käfigs schwingt der Käfig hin und her, so daß das Gluckertier zu einem ruhigen Leben kommen kann, dazu die Beunruhigung durch das freilebende Ge-

flügel und das Bestreben, zu diesem hinaus zu gelangen, alles das läßt das Tier die Brutflut bald vergessen. Selbstverständlich darf auch bei dieser Art der Haft ausreichende Fütterung und Tränkung nicht fehlen. Bei dieser humanen Behandlung wird man seine Tiere nicht schreden und schwächen, sondern in voller Leistungsfähigkeit erhalten, sich selbst zum Nutzen und zur Freude. Sch.

Pflege und Fütterung der Küken.

(Nachdruck verboten.)

In den ersten 36-48 Stunden sollen die Küken kein Futter erhalten. Die Natur hat dafür gesorgt, daß die Küken nach dem Auskriechen, bis sie genügend beweglich sind, kein Futter nötig haben. Der während der Brut nicht verbrauchte Dottersack wird kurz vor dem Auskriechen durch die Nabelöffnung in die Bauchhöhle eingezippt. Von dieser Dottersackmasse lebt das Küken zunächst. Werden die Küken zu früh zur Nahrungsaufnahme veranlaßt, so wird der Dottersack nicht verbraucht und er verhärtet oder er geht in Verwesung über. Dadurch kann der Tod der Küken herbeigeführt werden.

Als erstes Futter reicht man am besten Hafergrüße, Buchweizengrüße oder Bruchreis in trockener Form. Auch Krumen von gut ausgebackenem, mehrere Tage altem Weißbrot, ferner feine Graupen oder gebrochener Mais, sind als Kükenfutter geeignet. Mais soll aber nicht als alleiniges Kükenfutter zur Verwendung kommen. Bewährt haben sich auch geschälte Hirse, kleiner oder gebrochener Weizen und gerösteter Kanariensamen.

Von vielen Geflügelhaltern werden den Küken gleich von vornherein hart gekochte, zerdrückte Eier gegeben, die aber von den Tieren in der ersten Zeit schlecht verdaut werden. Das Verenden von Küken ist manchmal auf zu frühzeitige Eierfütterung zurückzuführen. Hart gekochte Eier sollte man erst vorziehen, wenn die Küken acht bis zehn Tage alt sind. Man kann auch die bei der Untersuchung der Brüter am 6. oder 7. Tage als nicht befruchtet, ausgebliebene Eier für die Kükenfütterung verwenden. Die Eier dürfen aber keinen üblen Geruch haben. Nebenbei sind frisch bereitetes Knochenmark, fein gehackte Eierschalen und eine kleine Zugabe von zerkleinertem Holzkohle zu empfehlen. Sodann hat sich auch gutes Fischfettmehl in geringen Mengen, etwa 5 Gr. auf ein Küken, täglich gerechnet, bewährt. Stets ist darauf zu achten, daß im Futterhaushalt der Küken trockener Sand in einer Schicht von mehreren Fingerbreiten vorhanden ist. Besonders ist dies von Bedeutung, wenn die Küken bei kühlem und feuchtem Wetter in geschlossenen Räumen leben müssen. Als Tränke kommt in erster Linie reines Wasser in Betracht. Milch darf man den Küken nur ganz frisch verabreichen. Sobald die Milch auch nur eine schwache Säuerung zeigt, verursacht sie Durchfall und Eingehen der Küken. Man füttert in Zwischenräumen von 2 bis 3 Stunden. Später verteilt man das Futter auf 4 bis 5 und weiterhin auf 3 Futterzeiten täglich.

Während zuerst Trockenfütterung eingehalten werden soll, wird von der zweiten oder dritten Lebenswoche an, mit kleinen Mengen beginnend, auch ein oder zweimal täglich Weichfutter gegeben, das unter Verwendung von Gerstenschrot oder etwas Haferstrot und guter Weizenkleie besteht. Das Weichfutter, das mit ganz feinem Milch angerührt werden kann, darf nicht wässrig, sondern es soll dickbreiig oder krämelig sein. Auch Würmer sind in geringen Mengen ein gutes Futter. Auf Reinhaltung der Futtergefäße ist bei der Verabreichung von Weichfutter besonders streng zu achten. Man lege zunächst nie mehr Futter vor, als bei einer Mahlzeit aufgezehrt wird. Wenn in den Gefäßen Futterreste, auch nur in schwacher Säuerung übergehen, und die Küken davon aufnehmen, so tritt meistens ein Kükenverderb ein.

Für die gute Entwicklung der Küken ist es dann wichtig, daß sie, solange ihnen noch kein Auslauf gewährt werden kann, täglich Grünfutter erhalten. Hierzu eignen sich junges Gras, Alee, Ceradella, Löwenzahn, Vogelmilch in entsprechender Zerkleinerung. Von manchen erfahrenen Geflügelzüchtern wird auf die Zugabe von jungen zarten Brennnesseln und etwas Schnittlauch in fein geschnittenem Zustand großer Wert gelegt. Solat soll man den Küken erst von der dritten Woche ab geben, da er zu Anfang leicht Durchfall hervorruft. Wenn im zeitigen Frühjahr das Grünfutter noch fehlt, so kann es durch fein gehackte Mören ersetzt werden.

Die Verabreichung des Futters soll aus solchen Gefäßen geschehen, daß die Küken das Futter nicht beschmutzen können. Die Tränkegefäße dürfen den Küken keine Möglichkeit bieten, in das Wasser hineinzutreten. Hierfür kommen selbsttätige Tränkegefäße in Betracht, oder auch einfache, flache Gefäße, in die man einen Stein legt, so daß am Rande eine Wasserlinie bleibt. Das Wasser ist öfters zu erneuern. Auch empfiehlt es sich, Vorrichtungen zu treffen, die Küken für sich zu füttern, ohne daß die Glücke dazu gelangen kann. Es werden auch Glückenkasten angewandt, bei denen die Glücken eingesperrt werden, die Küken aber nach Belieben herauszutreten vermögen. In diesem Falle erhalten die Küken ihr Futter außerhalb des Kastens. Wenn ein solcher Glückenkasten im Freien aufgestellt ist, dann sind die Küken aber mehr Gefahren ausgesetzt, als wenn die Glücke stets mit den Küken zusammen sein kann. Z.

Bekämpfung der Blattläuse.

(Nachdruck verboten.)

Ist in diesem Jahre besonders nötig. Sie erscheint im Frühjahr und legt sich an Wurzel, Stamm, Ästen und Zweigen des Apfelbaumes fest. Die im Frühjahr entstehenden Blattläuse haben keine Flügel. Sind sie ausgewachsen, bringen sie lebendige Junge hervor, die sechsbeinigen Larven, die sich an den Zweigen, den Ästen und Wurzeln des Apfelbaumes festsetzen und lebendige Junge gebären. Ende des Sommers werden Larven geboren, die Flügelansätze besitzen, die sich zu geflügelten Insekten weiblichen Geschlechts ausbilden. Es werden viele Mittel zur Bekämpfung der Blattläuse empfohlen, aber noch keines hat sich bewährt, zumal sie auch nur bei entlaubten Bäumen anwendbar sind. Aber gerade während des Sommers entstehen Blattläuse, die fortwährend unterdrückt werden müssen. Das beste Bekämpfungsmittel für diese Schmarotzer ist die Raupenfadel. Schon bei der Annäherung der brennenden Fadel flammt der Wachsüberzug der Blattläuse auf, so daß die Läuse in ihrem eigenen Fett schmoren. Bei fruchttragenden Bäumen genügt ein leichtes Hin- und Herbewegen, bei Zweigen und Ästen muß die Flamme länger wirken. Bei Verlängerungstrieben muß man vorsichtig sein, daß man sie nicht verlegt, bei den anderen schadet das „brennende Wundieren“ weniger, da sich bald die unteren Blattknospen entwickeln.

Weinbau und Kellerwirtschaft.

Das Schneiden der Reben gehört zu den wichtigsten Arbeiten des Winzers und Traubenzüchters. Es soll nicht zu lange hinausgeschoben werden, da sonst ein zu starkes Bluten eintritt. Aber den Schnitt selbst entscheidet Sorte und Organ. Jede hat ihre Eigenheiten, die berücksichtigt werden müssen. Man kann daher keine allgemeine Regeln geben, doch sollen für den Gartenfreund, der seinen Stod schneiden will, einige Regeln folgen. Beim Schneiden achte man darauf, ob die Reben nicht mit Schädlingen oder anderem Ungeziefer befallen sind. Wenn ja, so streiche man sie mit Schwefel-Ölbaumöl oder einem anderen geeigneten Mittel an.