



Die Börde.

Landwirtschaftliche Beilage zum „Soester Kreisblatt“

Nr. 23

Freitag, den 5. Juni 1928

27. Jahrgang

Der Geflügelhof im Juni.

Die grundlegende Arbeit für die Erneuerung des Tierbestandes ist getan: die Brut ist im großen und ganzen beendet. Wenigstens für Zugvögel ist jetzt nicht mehr gebrütet worden, da sich diese Zugvögel jetzt nicht mehr im Brutgeschäft betätigen. In der Regel mündet die Brut im Juni. Wo Abzug leicht möglich ist, und annehmbare Preise zu erzielen sind, ist dieser Zweck der Geflügelzucht eigentlich das ganze Jahr hindurch zu betreiben, vorausgesetzt, daß die nötigen Aufzuchtgelegenheiten vorhanden sind. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Zwerghühnerzucht, da manche Züchter dieser Rassen behaupten, daß Zugvögel die schönsten Tiere ergeben.

Sobald sich die Geschlechter unterscheiden lassen, sollte man Hühner und Hennen trennen. Sie gedeihen dann besser. Namentlich sind es die leichteren Rassen, die recht früh reif werden und sich dann unnötigermode schwächen würden. Gleichzeitig findet die erste Musterung statt. Alles, was aus irgend einem Grunde nicht für tauglich befunden wird, ist auszumergen. Man spart dadurch nicht nur an Futter, sondern kann den Zuchtgeflügel umso bessere Pflege und Wartung angedeihen lassen.


In Ställen und Kestern achtet man streng auf Reinlichkeit. Stühiges Futter darf nicht verabreicht werden, dagegen viel frisches und saftiges Tränkewasser. Da Weichfutter in der heißen Zeit leicht säuerlich wird, sind Futterreste alsbald zu entfernen und die Futtergefäße peinlich sauber zu halten. Die kräftigsten Hennen, die keine Brut mehr machen sollen, sperren man in Käfige mit Stattenböden, die im Freien so aufgestellt werden, daß die Tiere 20–30 Zentimeter über dem Erdboden stehen und die Luft von unten her ihren Körper umspült. Man gibt ihnen Gelegenheit zu trinken, füttert aber ganz wenig. Die Brutluft vergeht dann oft schon in zwei Tagen.

Gänse gehören jetzt auf die Weide. Bis zum Herbst brauchen sie dann keine nennenswerte Futterzugabe. — Enten können noch erbrütet werden: sie geben dann noch bis Oktober einen fastigen Braten. Um dem Fleisch einen pikanten Geschmack zu geben, mischt man unter das Weichfutter feingehackte Sellerieblätter. — Die Küken von Puten, Perlhühnern, Fasanen und Pfauen bedürfen sehr der Wärme. Dieses beachtet man besonders in den ersten Lebenswochen. Nur an stillen, warmen Tagen lasse man sie hinaus, schütze sie aber gegen grelle Sonnenstrahlen, Tau und Regen. Größere Puten treibt man, wie die Gänse, auf die Weide und Bruchwälder.

Auch im Taubenstall sollte man für größte Reinlichkeit und Lüftung. — Die Kester sind täglich nachzusehen, um abgestorbene Eier oder tote Junge gleich entfernen zu können. Um einem Ueberhandnehmen des Ungeflüsters zu wehren, spare man nicht mit Desinfektionsmitteln. Ein Bad darf in keinem Taubenstall fehlen. Das Wasser ist täglich zu ersetzen.

Der Selbstfütterer an der Stallwand.

Bei der Ausdehnung der Hühnerhaltung kommt man einmal an den Punkt, wo die Herstellung von Weichfutter wegen des damit verbundenen Arbeits- und Zeitaufwandes unmöglich wird. Man muß dann zur Trockenfütterung übergehen, d. h. auch die bisher im Weichfutter gebotenen Nährstoffe in einer Form reichen, die nicht nur keine besondere Zubereitung voraussetzt, sondern zugleich längere Lagerung erlaubt. Für diesen Zweck hat man besondere Mischungen zusammengestellt und besondere Vorrichtungen erbaut, in denen diese Futtermischungen den Hühnern zu beliebigem Gebrauch dauernd dargeboten werden. Einen solchen Trockenfütterer, den sich jeder aus Holz selbst zusammenfügen kann, zeigen wir hier im Querchnitt. Er wird entweder an einer Stallwand aufgehängt oder auf Stützen gestellt, die an der Wand befestigt sind. Vor der Mündung des Fütterers befindet sich ein Gitter, das die Hühner das Futter picken lassen, bringt man eine Sitzfläche an. Die harte Decke des Futterkastens



Wird hat man besondere Mischungen zusammengestellt und besondere Vorrichtungen erbaut, in denen diese Futtermischungen den Hühnern zu beliebigem Gebrauch dauernd dargeboten werden. Einen solchen Trockenfütterer, den sich jeder aus Holz selbst zusammenfügen kann, zeigen wir hier im Querchnitt. Er wird entweder an einer Stallwand aufgehängt oder auf Stützen gestellt, die an der Wand befestigt sind. Vor der Mündung des Fütterers befindet sich ein Gitter, das die Hühner das Futter picken lassen, bringt man eine Sitzfläche an. Die harte Decke des Futterkastens

Wir haben zu wenig Rhabarber.

Zu diesem Ergebnis kommt jetzt manche Hausfrau, die von ihrem Garten erwartet, daß er ihre Küche mit den Gerichten der Jahreszeit versorgt. Sie möchte fast jeden Tag eine Schüssel mit erfrischendem Rhabarberkompott auf den Tisch stellen, aber die Blätter wachsen nicht so schnell nach, wie sie davon erntet. Dann hat sie eben nicht genug Pflanzen, sollte man denken, aber dieser Grund ist nicht der einzige, der den Mangel verschulden kann. Die Pflanzenzahl wäre vielleicht ausreichend, den Haushalt zu beliefern, aber der Boden gibt nicht soviel Nährstoffe her, wie die Pflanzen umfegen möchten, oder die Sorte, die gepflanzt wurde, läßt es an Triebkraft fehlen. Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Ansprüche die Rhabarberpflanze stellt, wird man leicht entscheiden können, durch welche Maßnahme die gewünschte reichere Ernte zu erzielen ist.

Als besten Boden für Rhabarber bezeichnet man einen gesättigten, warmen, feuchten Niederungsboden. Daß er gut gefüttert werden muß, kann man aus seiner schnellwüchsigen und massenverzeugenden Natur schließen. Seine großen Blätter verdankt natürlich auch sehr viel Wasser. Dafür müssen die Wurzeln Ertrag schaffen. Bei einem Grundwasserstand von 100 bis 150 Zentimetern sind sie dazu bestens imstande. Stauende Rasse verträgt die Rhabarberpflanze nicht. Die Bodenart allein entscheidet über Erfolg und Mißerfolg des Anbaues nicht, die Hauptsache ist, daß der Standort eine starke Schicht frischer, nährstoffreicher Erde aufweist. Ob ihren Hauptbestandteil Lehm, Humus oder Sand bildet, ist weniger wichtig. Es überwiegt die Bedeutung der Besonnung. Es muß gerade als ein großer Vorteil beim Rhabarber hervorzuheben werden, daß er besser als viele andere Kulturgewächse im Schatten gedeiht. Nur das ist nicht verwunderlich: warme, sonnige Lage beschleunigt den Beginn der Ernte.

Der Rhabarber ist ein starker Zehrer am Boden, jedoch bei weitem nicht so gefräßig wie der Kohl. Die Düngermengen, die man ihm reicht, braucht man nicht ängstlich abzuwägen, er verträgt alles und lohnt es auch. Es ist z. B. vorteilhafter, eine kleinere Anlage ausgiebig zu düngen, als eine größere spärlich. Besonders im ersten Jahre darf man nicht knausern, denn von der fruchtigen Jugendentwicklung hängt der Ertrag der späteren Jahre ab. Auf ein Acker rechnen man etwa zwölf Zentner. Bei der tiefen Lodierung des Bodens vor der Pflanzzeit empfiehlt sich eine normale Rastung zusammen mit acht Kilogramm Thomasmehl als Vorfruchtung. Ältere Anlagen erhält man durch eine Herbstdüngung mit sechs bis acht Zentnern Stallmist leistungsfähig. Daneben kann man im

Frühjahr noch etwas Kainit oder 40prozentigen Kalk und Superphosphat verabreichen.

Zur Pflanzung verwendet man am besten geteilte Wurzelstücke aus bestehenden, guten Anlagen. Jedes Teilstück sollte mindestens zwei Knospen wiegen. Sämlinge geben ungleichmäßigen Bestand und viele Pflanzen mit zähen, herben Stengeln. Auch beim Rhabarber gibt es gute und schlechte Sorten. Die am meisten verbreitete Sorte heißt Verheißener Victoria. Die Pflanzen entwickeln sich schnell, treiben früh aus und geben frühe Ernte. Der Ertrag vom Morgen bewegt sich zwischen 200 und 250 Zentnern. Er wird noch übertrieben von der Sorte Amerikanischer Riesen-Rhabarber, die von einer Pflanze 20 Kilogramm Stiele liefert. Die Herbstpflanzung hat vor der Frühjahrspflanzung gewisse Vorzüge. Im Oktober geleiste Pflanzen wurzeln vor Winterbeginn noch etwas an. Die Pflanzweite muß man so wählen, daß ein dichter Bestand entsteht und der Boden von den Blättern völlig bedeckt wird. Dadurch spart man sich die sommerliche Bearbeitung des Bodens. Der Mindestabstand nach allen Seiten beträgt 1 Meter.

Daß man die Blütenstände des Rhabarbers, die im Mai zu erscheinen pflegen, nicht emporstecken lassen darf, ist den meisten Gartenfreunden bekannt, nicht aber, daß solches Vorgehen dabei geeignet ist, den Ertrag zu schmälern. Zur Bildung der Blüten nimmt die Pflanze einen viel stärkeren Anlauf als für das Wachstum der Blätter, und durch plötzliches Ausbrechen des Blütenansatzes müht man sich eine schnellere Umstellung ihres Stoffwechsels zu, als sie durchführen kann. Die Folge ist dann eine Störung im gesamten Wachstum. Diese Umgehung man, wenn man zuerst nur einen oder zwei besonders fruchtige Blütentriebe mit allen dazugehörigen Blättern auszieht und nach einigen Tagen die übrigen, späteren Triebe beseitigt man dann jeweils bei der Ernte der Blätter. Abgebrochen oder abgeschnitten werden dürfen die Triebe nicht, da die stehenden Stängel das Stützgewebe der Pflanze beeinträchtigen. Gleichwohl schneidet man je die Blätter ab. Nichtig ausgelegene Stiele müssen am Ende zwei Knospen haben. Die ältesten Blätter läßt man stehen, nur die jungen, fast ausgewachsenen Stängel werden geerntet. Man darf die Pflanzen auf einmal nicht zu großer Blattflächen berauben. Nach Beendigung der Ernte, Ende Juni, dienen die Blätter der Pflanze dazu, sich für das nächste Jahr von neuem zu kräftigen. Im Herbst läßt man sie weit werden und entfernt sie erst, wenn sie sich von selber von den Pflanzen gelöst haben.

eine lockere, gekrümelte Oberfläche, die den Wassernarrat im Boden bewahrt und ihm dadurch dauernde Frische gibt. Solange man zwischen die Pflanzen kommen kann, muß diese Krümelnschicht immer wieder hergestellt werden. Haben sie sich dicht über dem Boden geschlossen, dann bleibt die Krümeldecke in ihrem Schatten bestehen.

Vom Düngerhaushalt des Bodens.

Jedem Gärtner ist bekannt, daß die Kohlarten anspruchsvoller in Bezug auf Düngung sind als Wurzelgewächse wie Gurken und Möhren. Der Landwirt weiß, daß die Hackfrüchte besondere Ansprüche an die Nährstoffzufuhr stellen. Aber auch innerhalb derselben Pflanzenart sind die Anforderungen an den Nährstoffhaushalt des Bodens durchaus verschieden. Der Landwirt baut des öfteren Hafer als abtragende Frucht, d. h. als leichte Frucht in der Fruchtfolge. Es geschieht das aus dem Grunde, weil diese Pflanze, verglichen mit den anderen Hackfrüchten, in besonderem Maße imstande ist, sich Nährstoffe anzueignen. Für diese Fähigkeit ist nicht allein der Umfang des Wurzelwerkes entscheidend, sondern auch die Eigenart der Wurzeln. Diese wirken nämlich mit Hilfe von Säureausscheidungen tief auf die Bodenart ein und können somit oft dort noch Nährstoffe vorfinden, wo andere Pflanzen schon hinführen müßten. Aber auch eine Pflanze mit dem besten Wurzelvermögen muß einen gewissen Nährstoffvorrat im Boden vorfinden, um gedeihen zu können. Hierin unterscheiden sich nun die Böden von Hause aus. Im allgemeinen kann man wohl sagen, je leichter, d. h. je sandiger ein Boden, um so ärmer ist er an Nährstoffen, um so notwendiger ist also die Düngung. Das bedeutet nun freilich nicht, daß die guten Bodenarten geringerer Düngung bedürften. Hier fällt ins Gewicht, daß die Ernten besser ausfallen, also mehr Nährstoffe durch sie forgerührt werden. Infolgedessen muß auch die Nährstoffzufuhr höher sein.

Einen Ueberblick über den Nährstoffhaushalt und damit das Düngerbedürfnis des Bodens gibt uns die Bodenuntersuchung. Den Stickstoff liefert den Pflanzen in der Natur der Humus. Ein Ueberbegriff des Bodens an Stickstoff ist nicht nötig, wir messen ihn je nach Bedarf der Pflanze dem Boden zu. An Phosphorsäure und Kalk hingegen muß ein gewisser Vorrat im Boden vorhanden sein. Nach den neuesten Untersuchungen ist dies nun leider meist nicht der Fall. Besonders der Phosphorsäurevorrat unserer Böden ist stark zurückgegangen. Auf diesen Punkt ist daher bei der Düngung besonders zu achten. Um Abhilfe zu schaffen, bestehen hier weder technische noch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Bestehen wir doch im Thomasmehl ein Düngemittel, mit dessen Hilfe wir dem Boden, ohne Schaden für seine Struktur und ohne Verluste befürchten zu müssen, an Phosphorsäure anreichern können, und auch in wirtschaftlicher Hinsicht läßt sich diese Maßnahme durchführen; denn setzen wir den Preis dieses Düngemittels 1913 = 100, so beträgt er heute 86, während z. B. der Preis für Roggen 1913 = 100, heute = 165 beträgt.

Gerade die letzten niederschlagsreichen Jahre haben gezeigt, wie unangenehm sich der Phosphorsäuremangel im Boden bemerkbar macht. Lagerstern und Kalkbrenn waren die bekanntesten Begleitererscheinungen. Viel Stroh und wenig und leichte Körner kennzeichnen die Ernten der letzten Jahre.

Was der Kleintierzüchter im Juni beachten muß.

In der Kaninchenzucht bringt der Juni den zweiten Wurf. Die Jungen des ersten Wurfs, die inzwischen soweit heran-gewachsen sind, daß sie nach Geschlechtern getrennt werden müssen, sind als Zuchttiere beizubehalten. Weniger gute Tiere mäht man für die Küche. Die Fütterung der Kaninchen verlangt besondere Sorgfalt, sonst bleiben die gefürchteten Krankeheiten Trommelfluß und Speichelfluß nicht aus. Immer verfüllt man etwas Heu mit, das Nagebedürfnis befriedigt man durch einige Baumzweige. Die Stallungen sollen rein, ungefrierfrei und nicht zu sonnig sein. Jungkaninchen müssen ständig beobachtet werden. Schwächliche Tiere werden von den anderen vom Futter weggedrängt und mageren infolgedessen ab. Solche Tiere müssen also besonders gefüttert werden, am besten trennt man sie überhaupt von den übrigen. Ist der Jungtierstall nicht geräumig und hell, so muß man für seine Bewohner unbedingt einen Auslauf herrichten, wo sie sich einige Stunden des Tages tummeln können. Aufenthalt und Bewegung in frischer Luft macht die Tiere kräftig und gelinder, gute Nachkommenschaft zu liefern. An Stelle des reinen Tränkewassers kann man übrigens den Kaninchen das beim Kochen von Gemüsen übriggebliebene Wasser, das Kartoffelwasser, Abspülwasser und Spülwasser aus Milchgefäßen für Schweine geeignet. In der Ziegenzucht beginnt jetzt die Weidezeit. Die Tiere sind erst dann auf die Weide zu treiben, wenn der Tau getrocknet ist. Vor Kälte und Kälte, Sonnenbrand und Durst sind die Tiere zu bewahren. Beim Anbinden verfährt man so, daß die Tiere sich nicht in den Leinen festwickeln oder aufhängen können. Das erreicht man am einfachsten durch einen um den Pfahl frei beweglichen Ring, an dem die Leine befestigt wird, oder einen drehbaren Hals am Halsband. Rasse Weiden mit hohem Grundwasserstand sind wegen der Leber- und Lungenerkrankungen, die sich an den Gräsern im Ueberwuchsgebiet befinden, gefährlich, ebenso solche Weiden, die im Ueberwuchsgebiet von Flüssen liegen, da deren Wasser immer durch Abflüsse von Fabriken oder Bergwerken verunreinigt ist. Bei der Stallfütterung verwende man fleißig Abfälle aus Garten, Feld und Haushalt. Dazu gehören Weizentriebe des Weinstocks, das Blattwerk abgenutzter Erdbeerbette, Abschnitte der Hecken, Erbsen- und Bohnenstroh, allerlei Kräuter usw.

Dünnsaat und Hackmaschinen.

Viele Landwirte wenden gegen die Dünnsaat des Getreides ein, sie gebe nur dem Unkraut mehr Raum. Sie hätten wohl Recht, wenn es keine Abhilfe dagegen gäbe. Da es aber möglich ist, das Unkraut mit Hackmaschinen zwischen den Getreidezeilen zu unterdrücken, ist der Einwand nicht stichhaltig. Alle Getreide, die man durch Dünnsaat säht, werden durch das regelmäßige Hacken befestigt, weil nicht nur das Unkraut vertilgt wird, sondern das mit dem Hacken verbundene Anheben zugleich ein reicheres Bestehen der Getreidepflanzen verursacht. Außerdem erhält die wiederholte Brechung der Bodentriebe